




McGill



Osler
Library
Montreal

455
2



157

DISSERTATIO MEDICA,
INAUGURALIS,

DE

Febribus Intermittentibus Medendo.

QUAM,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

Ex Auctoritate Reverendi admodum Viri,

D. GULIELMI ROBERTSON, S.S.T.P.

ACADEMIÆ EDINBURGENÆ Praefecti;

NEC NON

Amplissimi SENATUS ACADEMICI consensu,

Et nobilissimae FACULTATIS MEDICÆ decreto,

PRO GRADU DOCTORIS,

SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS;

Eruditorum examini subjicit

FRANCISCUS BUCHANAN, A. M.

SCOTUS.

Phyf. Societ. Sod. Hon. et Praef. Ann.

Ad diem 12. Septembris, hora locoque solitis.

EDINBURGI:

Apud BALFOUR et SMELLIE,

Academiae Typographos.

M,DCC,LXXXIII.

MISSISSIPPI

IN THE

OF

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

Paginas sequentes,

Praesidio et dulci decori suo

ROBERTO GRAHAM

DE GARTMORE,

Qualem esse decet, quem ardens purpura vestit,

Grato animo inscriptas esse

Auctori placitum est.

THE

LIBRARY

OF THE

UNIVERSITY

OF CALIFORNIA

BERKELEY

1900

1848

1848

1848

Dissertatio Medica inauguralis
de

Februm intermittentium curationibus

Si natura morbis, remedium, omnibus tribuisset.
ne ac cortex Peruvianus contra febras intermittentes
icac, multi, cito perituri diu inter viros enum-
rari potuerint.

DISSERTATIO MEDICA

INAUGURALIS,

DE

Febribus Intermittentibus Medendo.

SI alma natura, ad omnem morbum debellandum, remedium hominibus tribuit, aequae ac cortex Peruvianus ad febres intermittentes efficacax, multi, cito perituri, diu inter vivos enumerari poterunt. De medendis igitur hujusmodi febribus tractare, vix multis necessarium videbitur; et quae nunc sunt tradenda, nihil aliud his prae se ferre videntur, nisi inanem doctrinae ostentationem. Illi quidem, voce sublata, exclamant, accipite corticem febricitantes, accipite sanitatem. Non raro autem, imo et saepissime, eo devenire curae labores dolendum est, ut quivis, licet ingenio et doctrina praestantissimus,


A

mus,

mus, febris reluctans ingenium, et medicinae experitur inopiam.


2. Praeterea, quemadmodum nihil eorum, quae vel sano corpori innocentia sunt, vel certis morbis medentur, universim ita juvat, ut nullam noxam, pro ratione symptomatum, sub quibus ministratur, incaute adhibitum inferre possit; neque quicquam est, cujus virtutes nullo vitiorum confinio laedi queant: Ita idem de hoc febrium domitore sentiendum esse, ipsa eo magis dicat sana ratio, quo manifestior in morbum efficacia est. Unum igitur remedium, pro febrium omnium unica solaque panacea habere non licet, caeteris artis praesidiis fusque deque habitis. Itaque medicum oportet, pro ratione symptomatum varia, atque praesenti febris natura, in unum vel alterum extremum tendentis, rationem medendi saepius, atque incunctanter, quoties opus fuerit, mutare.

3. Occurrit inter variarum gentium, et variorum seculorum medicos, de ipsis remediis experientia comprobatis, perpetuus et mirus diffensus. Et mirum in modum experientiam omnes sibi vindicant ut magistrum et ducem; nihilominus autem multi ei innixi cortici ipsae diffidunt, vel, si quam ei concedant vim, artis concludunt





S
e
icas
ar



cludunt limitibus; eadem vero utentes minime de methodo consentiunt. Ita incertis opinionibus miserorum hominum traditur vita! Ad haec determinanda, ingenium et experientia deficientia vetant me in hanc arenam descendere, ubi tot viri praeclari non sine laude semetipfos exerceverunt. Igitur fere semper Celsi venerabilis monitum sequens; neque addictus alterutri opinioni, neque ab utraque nimium abhorrens, mediam quodammodo viam inter diversas sententias tenebo.


4. Pauperes saepius quam divites febres intermittentes perdunt, saepissimeque vastant castra militibus, et classes nauticis; hos autem nimis saepe cortice parca et cara uti, ejusve commodis frui, vetant paupertas dira, et etiam corticis inopia. Si tunc medici alia remedia ignorant, pauci mortem effugient.

5. His adductus, remedia non solum corticem juvantia, sed etiam illa ignota quondam usurpata, enumeravi. Inter haec forte remedium minoris pretii latet, quod tamen, aequaeque cortex ipsa, in febres efficax sit. Nullum saltem remediorum roborantium praeter hanc experimento iusto subiectum est. Licet enim haec, a tempore Hippocratis, interdum auxilio vocaverunt

vocaverunt medici, nunquam tamen, nisi omnibus incassum tentatis, ad ea confugiebant; sed semper vis venenatae arguebant. Cortex forsitan nomen sibi magnum casu fecit. Huic enim Sydenhamus, Mortonus, alique vim, materiam morbificam corrigendi, tribuerant; quo medici inducți, dum alia roborantia metuerent, eam audacter exhibuerunt. Fatendum tamen est, nullum tale adhuc ostendi.

6. Pensum meum peragens, remedia multa inutilia, imo nociva, enumeravi. Quanquam autem multa sint, ad ipsas artes proprie non pertinentia, tamen eas adjuvant, excitando artificis ingenium. Paginae haud sinunt remedia singula perpendendum; quae igitur efficaciora duxi, literis majoribus notavi. Quoad doctrinam, ubique CULLENUM passibus quidem haud aequis secutus sum; quia omnium theoria ejus optima mihi videtur. Arrogantiam meam vix unquam extenuaturus sum: Licet enim saepe inter viros etiam illustrissimos discernere ausus fuerim, quid opus est verbis? Illi enim opinionem meam nihil valere sciunt, atque igitur nihili aestimant.

7. Non solum febrifuga enumerare, sed etiam eorum operandi modum explicare, mihi propositum



Comment: in New York. A.P.H. 8757.

First Lines of the Practice of J. H. P. XLIX

Se

re

can

car

fitum est; utrumque certe secutus sum. Talem igitur febrium pathologiam, qualem veram esse judico, statuat oportet. Et CULLENUM sequens, febres remittentes ab intermittentibus haud discrepare inter se, vel quoad causas, vel quoad curationem, omnino abritror.


8. Statuerant medici materiam quandam morbificam, in sanguine haerentem, causam esse proximam morbi. Mala quamplurima hanc opinionem sequebantur. Medici enim febrem depellere, antequam haec materia concoctionem passa fuerat, verebatur. SWEITENI^{*} autem et CULLENI[†] argumenta, me iudice, materiam talem nunquam existere, satis superque demonstrant. Sed etiam si huic opinioni veritas concedatur, quid sequetur? Materia enim haec, si fluidis unquam inhaereat, non potest ullos effectus edere, nisi afficiendo corporis solida viva. Nonne ergo haec tali statu inducenda sunt, quali materiae actioni resistent? Si status solidorum aliquis materiae actioni primae resistat, nonne similis status (II.) applicationibus sequentibus resistet? Nonne corpus sanum et vegetum, facilius quam corpus a febre occupatum, et debilitatum, materiam eliminabit?

9. Arbitrantur ergo nonnulli, et vero jure, febres intermittentes optime curatum iri, si removeantur illi status solidorum, quos morbi symptomata in variis ejus stadiis ostendunt. Hoc pluribus repugnat. Illi enim arbitrantur, nulum remedium dari, quo ulla febris solide, et ex ipso fundamento, curetur, nisi per illos motus qui spontaneae febrium indoli familiares sunt. Motus hos autem fere semper morbosos, molestos, et febrem longiorem gignentes, judicavimus (22.); eos igitur caveamus oportet.

10. Si aliquis diu febre laboravit, etiam si intermissiones plenas habuerit, et si porro viscera abdominalia haud illi sunt oppleta, nihilominus fere semper hydropes corripitur; qui hydrops, merito, a solidorum relaxatione universa oriri censetur. In febribus diuturnis ergo relaxatio semper debellanda est.

11. Corpus vegetum, et inedia, evacuationibus, labore, ebrietate, libidine, vigiliis, studiis protractis, vel morbo infractum; sed vino, pathematibus animi excitantibus, et exercitatione roboratum, vix causis intermittentium excitantibus afficitur; scilicet, quia exinde fibrae cordis et vasorum musculares vigore debito agunt. Nonne igitur statu fibrarum earundem simili,

(12.)



liber de recond: febr: natura l. 3. c. 3.
+ Aph: de cognos: et aut: morbis d. 1. 50

s.

se

icar

car

(12. 13.) paroxyfmi fequentes quoque averti poffunt ?

12. Si afpicias febris paroxyfmos centum, in horum nonaginta novem videbis ftadia aliqua, fymptomatibus propriis notata, fe invicem, femper eodem ordine, excipientia. Ita faltem medici fere omnes dixerunt. Sed, veluti nulla eft ridicula opinio, quae authorem non habuerit philofophum^{*}, ita huic opinioni, qua nihil in medicina certior, homines aliqui, tenuis quidem iudicii, objecerunt ; quibus, fi aliquis vult, credere licet. Quamquam igitur haud poffum, per leges mechanicas, rationem reddere, qua unum ftadium alterius veftigia fequitur ; nihilominus, quoniam ita regulariter res fe habet, unum ab altero gigni haud dubito. Atque[†] hic BOERHAAVII ratiocinationem fequimur.


13. Opinio fere femper medicorum potita eft, eofque, etiam in viforum enarratione, aberrare fecit ; tamen, fi fas fit aliquid medicorum fidei credere, mihi licet affirmare, paroxyfmi prima fymptomata cordis et vaforum actionem imminutam oftendere. Et meam opinionem ut firmarem, morbi hiftorias a medicis diverfarum aetatum, locorum, et opinionum traditas, citabo ;

bo *; durante ergo intermissione, medicum nitī contra hanc affectionem pro aegro nocte dieque decet; hac enim remota, nullus fit paroxysmus. (12.)

14. Cor autem et vasa haud diu in hoc statu perdurant; contra equidem cito vim amissam rursus recipiunt, imo etiam plerumque vi justo majore agunt. Si illorum actio multum et ad gradum abnormem intendatur, summo fructu iterum medicus eam comescet. Si autem actio, licet molesta, se intra limites moderatos teneat, facile in statum pejorem remediis vertitur; quicquid enim vires minuit, statum, in quo actio cordis et vasorum diminuta est, iterum facile inducet; et ex imbecillitate summum est periculum.

15. Dum paroxysmus ita pergit, ab initio cutis arida, et omnes secretiones diminutae tenuisque manserunt. Medici tres causas, tales effectus edentes, animo conceperunt; crassities nempe fluidorum nimia, cordis actio ita debilis, ut sanguinem ad vasa extrema propellere nequeat,

* Celsus de re medica, l. 2. c. 2.; Sylvius de le Boe Prax. med. idea nova, l. 1. c. 30. §. 13.; Boerhaave aph. 749.; Stahlus de tert. febr. apud Halleri disp. med. pract. tom. 5. p. 5. Cullen's first lines, X.



* Comment. 5755. & 757.

* First lines XLVIII

S.
e
cas
ar

queat, et capacitas vasorum extremorum diminuta. Primam causam in febribus nunquam obtigisse, crediderunt SWEITENUS^{*}, et CULLENUS[†]; argumentaque eorum, meo iudicio, rem extra dubitationem posuerunt. In paroxysmi stadio primo causam secundam obtinere, jam diximus (13). Cum autem postea actio cordis multum augeatur (14.), huiusmodi causam concedere nequimus; ad tertiam causam igitur tribuenda sunt symptomata, durante stadio secundo.

16. Quandocunque fibrae musculares contrahendi vires amittunt, eodem tempore facilius a stimulo aliquo admoto afficiuntur, ut ex multis compertum est. Etiam si vero contractionem naturalem semper mox sequitur relaxatio, si autem ultra vires intenduntur fibrae musculares, haud nisi multo post iterum relaxantur, quod in Tetano facile videndum est. Cum igitur vasa extrema omnium debilissima vires suas amittunt, facile stimulo sanguinis applicato ad motum abnormem excitantur, quem motum relaxatio nulla statim sequitur; sed interea, dum stadium calidum manet, cutis arida, et secretiones tenues perdurant.

17. Medici saepe nesciunt, cui symptomata multa febrium tribuant; saepe enim in imaginatione solum haerent haec symptomata, et febres debilitat^{*}aeque ac diathesi phlogistica adjunctas comitantur. Meo quidem judicio, plura horum a circuitu sanguinis per vasa extrema impedito exoriuntur. In his autem insistere minime fert animus. Argumentum enim nihil exigit, nisi ut, quatenus monstrant viam ad praxin veram, talia statuam. Quocirca pauca tantum explicare tentabo, eaque institutis haud aliena.

18. Quamvis muscoli vi insita fruuntur, tamen facultatem movendi, actione cerebri, deleta brevi amittunt. Et porro cerebrum functiones suas sanguinis circuitu impedito perficere nequit. Dum igitur in febre sanguis vasa cerebri minima haud intrat, neque ad functiones suas perficiendas stimulat, musculorum motus impeditur, quo febricitantes, seu motus cordis validus sit, sive debilis, semper experiuntur lassitudinem et languorem.

19. Sensatio quoque a cerebro pendet. Actione igitur cerebri diminuta, diminuuntur sensationes; et exinde febricitantes frigoris sensu saepe

[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint handwritten notes in the left margin, possibly from an adjacent page]

saepe vexantur, cum eodem tempore calor corporis revera justo major est.

20. Jam monui, consilium medendi a sanguinis circuitu debellato oriri (13.); si igitur ulla indicatio a sanguinis circuitu per vasa extrema impedito oriatur, necesse est, ad vasa extrema coarctata dirigatur. Diximus, hanc ex nimia mobilitate a debilitate pendente oriri (16.). Removeatur igitur vel praecaveatur coarctatio haec roborando vasa extrema, vel removendo mobilitatem.

21. Medici quamplurimi sudorem singulos ferme paroxysmos sequentem, horum partem esse essentialem arbitrantur; an merito, multum dubito. Aeger enim, durante sudore, functionem omnem facile perficit. Sudor porro, in sanis, cordis semper actionem auctam sequitur. Sudor igitur nihil praeter sanitatis reditum denotare mihi videtur: Haud multum ergo attentionis sibi in curatione vindicat; neque ulla indicatio ad sudorem removendum datur.

22. Quanto diutius paroxysmi persistunt, eo citius sequentes excipiunt. Sic tertiana remittens saepius duplex est, et quotidianae paroxysmis omnium longissimis aegros vexant. Quicumque ergo paroxysmos breviores reddit, intermissiones

termiffiones longiores producet ; et, fi paroxyfmos folvit, vel certius fi venienti occurrit, morbum penitus removebit. Sed paroxyfmi fudore erumpente finiuntur (21.); quidcunque ergo actioni cordis et vaforum diminutae occurrit, vel vaforum extremorum coarctationem folvit, vel praecavet, febrem penitus removebit (15. 20.).

23. His ad univerfa fpectantibus praemiffis, me ad remedia fpeciatim recensenda fummis viribus accingo. Duas vult CULLENUS effe claffes; in prima, quae paroxyfmos avertunt, et in fecunda, quae paroxyfmos folvunt, remedia comprehenduntur. Sed quoniam multa in febrrium natura horum ufui faepe obftant, vir illuftris praemiffis claffem tertiam adjecit ; quae remedia ad ftatus corporis illos, qui febri occurrere vetant, amplectitur. In recensendis illis remediis febrifugis dictis CULLENI methodo utar, quia affinitatis legibus magis quam ulla alia confona mihi videtur. Sed quandoquidem obfervationes fequentes ufum corticis legitimum illuftrare praecipue ftatuuntur, ordinem CULLENI inverti, corticifque confiderationem ad ultimum pofpofui ; quo facto, verborum iterationem faepe vitavi.

24. Diathesis systematis phlogistica, viscera abdominalia obstructa, et humores corrupti ventriculo intestinisve inhaerentes, status corporis illi censentur, qui praecipue febres quam primum remediis recensendis coerceri vetant.

25. Diathesis phlogistica est status fibrarum musculosarum, in quo ex stimulo admoto vi justo majore contrahuntur. Vaforum igitur extremorum, in stadio febris primo, coarctationem immanem gignit; unde paroxysmi diu perstant, saepius repetuntur, et in initio languore summo (18.) et frigore magno (19.) stantur; incipiente autem stadio secundo, ingens fit aestus, delirium cum dolore capitis acuto urgent, rubor ore incandescit, tempora micant, et arteriae ictu duro validoque digitum feriunt.

26. Diathesis phlogistica saepissime in regionibus frigidis, durante vere, in tertianis et quotidianis, sub morbi initium, et in viris adultis, exercitatione et diaeta plena fruentibus, occurrit: Rarius autem sub Sole ardente, vel durante autumno, versus morbi finem, in quartanis, in infantibus, vel senibus, vel foeminis, vel desidiosius, vel demum in famelicis, videtur.

27. Multis

27. Multis vix animo percipiendum est, quomodo ullus, diathesi phlogistica laborans, repente vaforum debilitate corripiatur; vel si huiusmodi aliquid acciderit, quomodo iterum tam brevi diathesis phlogistica effectus suos edat. Res autem sic se habere, firma edocemur experientia; quocirca ipsa indicat, huiusmodi conditiones roborantium usum haud admittere. Sed nullum est remedium aequae efficax contra intermittentes atque roborans. Porro diathesin phlogisticam paroxysmos longos, acerbos (25.), et saepe repetitos (22.) gignentem removendo, non solum febrem lenire, sed etiam ex toto fugare possumus. Idcirco summa ope contra diathesin phlogisticam niti, medicos oportet. Caveant autem cane pejus et angue, ne corporis conditionem praedictae contrariam inducant; quo enim debilior, eo in angusto magis aegri spes est.

28. Febres aliquando prae se speciem ferunt, de qua a vero aberrare medicus facile potest. Febris enim carotica corticem utendam exemplo ^{*}exigit; speciem tamen apoplexiae induit. Apoplexia haec stadium algidum comitatur, et nonnunquam ad syncopen accedit, ut in febribus syncopalibus, lypyriis, et affodis dictis. Il-
lam

* Wierlhof obs. de febr. et Lauter. Hist. med. bienn. 1791

* Bullen first lines CXXXI.

t. Cyrillus Phil: Joans: N. 410, p. 142.

Se

ne

ican

car

lam igitur non in cerebri compressionem, sed in excitationis defectum, ob sanguinis in cerebro inopiam (18. 19.) confero.

29. Regimen antiphlogisticam, sedantia, SANGUINIS MISSIO, et cathartica, contra diathesin phlogisticam plurimum valent.

30. Vix dubitandum est, quin febres remissiones nullius momenti habentes, regimen antiphlogisticum postulent; id enim beneficium in pyrexia omnigena confert*. Sed in intermittentibus, etiam durante paroxysmo, actione vaporum vehementi comitatis, usus hujus regiminis circumspectionem magnam desiderat. Antiqui primis diebus convellendas aegri vires inedia putaverunt; et nonnulli recentiorum, in Italia praesertim, eorum vestigia secuti sunt. Hi quidem ne cibum gustari primis septimis februm pessimarum diebus sinerent, et aquam puram ad libitum potari solum concedebant†. Abstinentiam aliquando aegris conducere, haud dubito. Ita enim solummodo febres curari, dixerunt viri celeberrimi*. Sed abstinendi a cibo primis diebus, in febribus tantum diathesi phlo-

* Heister. Compend. Med. Pract. c. 2. § 16. p. 28.

Linnaeus Amoen. Acad. t. 1. p. 15. *Plater. Praxis Med. t. 2, p. 100.*

phlogistica comitatis, sunt aegri; idque tamen non adeo agendum, ut aegri vires convellantur, existimo. Imo etiam prima intermissio plena cibum dari, plerumque postulabit; momente enim BOERHAAVIO, tenuis et exacta diaeta nocet per se semper.*

31. Sedantia, alias refrigerantia dicta, sunt remedia, quae sine evacuatione de vi contractionis fibris muscularibus demunt. Sedantium duo genera ad febres intermittentes arcendas adhibita sunt; frigus nempe, et sales neutri. Itali, ut supra dictum est (30.), aqua frigida sola febres curabant; eamque, secundum diaetae aquae regulas, usque ad libras xxiv. per spatium totidem horarum, et ad famam commode dabant! Quum autem auctores, quos saltem mihi vidisse contigit, de hoc nihil statuerunt, ei operam dare nolo. Multi opinantur sales neutros sedare. Sed, quoniam consiliis medendi diversis inserviunt (120. 133.), de iis in hoc loco tacebo.

32. Si vires convellendae sunt, praesentissimum remedium, quo hac fine potire licet, est VENAECTIO. Et hujus quidem tanta certe est efficacia, ut si effectum celerem et egregium quem praestat spectemus, revera omnia interna remedia

*aph: 762.

204-1104

THE HISTORY OF THE

REIGN OF KING CHARLES THE FIRST

BY SAMUEL JOHNSON

IN TEN VOLUMES

LONDON: Printed by A. MILLAR, in Pall-mall.

MDCCLXXII.

Vol. I.

CHAP. I.

THE DEATH OF KING CHARLES THE FIRST.

IN THE YEAR 1649.

THE HISTORY OF THE

REIGN OF KING CHARLES THE FIRST

BY SAMUEL JOHNSON

IN TEN VOLUMES

LONDON: Printed by A. MILLAR, in Pall-mall.

MDCCLXXII.

Vol. I.

CHAP. I.

THE DEATH OF KING CHARLES THE FIRST.

IN THE YEAR 1649.

THE HISTORY OF THE

REIGN OF KING CHARLES THE FIRST

BY SAMUEL JOHNSON

IN TEN VOLUMES

LONDON: Printed by A. MILLAR, in Pall-mall.

MDCCLXXII.

Vol. I.

CHAP. I.

THE DEATH OF KING CHARLES THE FIRST.

x
ne
ica
ras

remedia in morbis, ubi indicatur, sanandis, longissime exsuperat. Neque ullum remedii genus est, quod et operationis celeritate, et tolerantiae facilitate, ita se commendet; et quod a primis fere medicinae incunabulis, tam frequenter et laudate fuerit adhibitum, quam sanguinis missio. Res ipsa igitur exigit, ut aliquid temporis illius considerationi impertiam. Licet autem pro virili parte accinctus, propositum haud sine diffidentia curaue aggredior. De usu enim venaesectionis in intermittentibus, summa dissentio est inter magnos homines.

33. Veteres medici humores in receptaculis, nescio quibus, stagnantes fomitem morbi fuisse fomniarunt; indeque toto coelo errantes, utramque curationis paginam longo apparatu medicaminum evacuantium impleverunt; idque methodice factum dixerunt, licet absque aliqua certa indicatione a natura rei ipsius desumpta; sed in propriis musaeis excogitata. Exinde tamen venaesectionem, evacuando humores morbosos, esse remedium contra intermittentes praestantissimum arbitrati sunt. Nec unquam, sanguinis detractio^xne omissa, curam susceperunt. CLEGHORN^x ipse in illorum sententiam discedebat; dixit enim, se semper nihil admo-

C

dum

dum interdicente sanguinem detraxisse.* Et inclytus Senac id tutius esse aiebat, non necessariam tentare venaesectionem, quam ab ea praeter rationem temperare.†

34. Sylvio, quondam Lugduni Batavorum Professore celeberrimo, viam monstrante,§ non negamus conducere aliquando in febribus intermittentibus V. S. verum non tamquam intermittentibus, sed tamquam symptomatibus ipsis comitantibus. Et cum SYLVIO medici nunc illustrissimi consentiunt.¶

35. Cum V. S. sine discrimine usurpatam oppugno, oportet fatear, eam in febribus diatthesi phlogistica comitatis non solum utilem, sed etiam saepe necessariam, esse. Febrium enim harum curationem sanguinis detractio omissa, summo cum periculo, et inepte molimur. Praeterea V. S. paroxysmos levat, multis malis jam adfuturis occurrit, et nonnunquam moribundos ab orco eripit; imo etiam, si febris fomitem in diatthesi phlogistica habeat, facile ad exitum operationis sanguinis missae adducetur. Haec cum ita sint, mirum fane viros non incelebres V. S. in febre ut noxiam ablegasse.†

36. Haud negandum tamen est, quod hoc ipsum auxilium observationem et prudentiam

in

x Obs. on the Epidem: difo. of Minorea p: 197.
t. de febrilibus l. 3, c. 5.

§ Opera medica p: 804. § 178.

11. Morton op: med: t: 2, c: 3, c: 6, p: 55; et c: 8, p: 103. Sweiten
aph: 762. Keister compend: med: c: 2, § 15, p: 25. Dehaen Ratio med:
t: 3, p: 319.

=. Morton loco citato p: 102. Hillary obs: on the dip of Barbadoes
p: 22 et 90. Pringle dip: of the army p: 200. Hume, letters on
the dip cases of the W. Indies p: 250. Donato Monro account of
military hospitals t: 2, p: 104.

℥ Mushenbrock Phil: Trans: N. 425, p: 357. Senae de febrilibus
l: 3, c: 5. Tiptot avis sur la santé c: 18, § 261. Glegghorn Minorea
p: 198. Monro t: 2, p: 83.

† Sydenham Op: Amstel: 8^{vo} p: 91.

x viros

[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

x
e
ca
ca

in usu semper desiderat; et quoniam nonnunquam hoc necessarium est, quemadmodum sit utendum eo dicemus, si prius iis de rebus quae ejus usum suadent, vel quae vetant, dixerimus.

37. Febris nunc grassans V. S. magis, quam febris tunc frequens, nonnunquam postulat; v. g. febris quae anno 1729 Ultrajecti populum vastabat, paucos pepercit, qui sanguinis jacturam non faciebant*; contra autem illa Magni Portus, (Anglice Portsmouth), anno 1755 publice grassans, licet capitis dolore, vertigine, et delirio stipata, scalpelli usu abhorrebat†.

38. Miasmata paludum putridarum forte febres gignunt, quae V. S. minus, quam febres a frigore et humiditate initia sua ducentes, exigunt‡. Multa autem desunt hanc opinionem stabilire; aliae enim febres, a simili causa orientes, sanguinis jacturam sine damno passae sunt§.

39. Illi,

* Muschenbrock, Phil. Transf. No. 425. p. 357.

† Lind on the diseases of Europeans in hot climates, p. 27.

‡ Pringle, diseases of the army, p. 208.

§ Cleghorn, Minorca, p. ~~180~~. 197

39. Illi, qui vitam ad diathesin phlogisticam proclivem egerunt, omnium V. S. maxime desiderant. Oppositum praedicari potest. Hinc febres regionum calidiorum, licet multis signis phlogisticis stipatae, sanguinem admodum caute mittendum postulant. Hinc infantes, et senes, et foeminae, et ignavi, et inedia confecti, usum hujus remedii aegrius tantum ferunt. Monente vero Celso venerando, usus ostendit, nihil ex his esse perpetuum, aliasque potius adhibendas rationes esse, ad quas dirigi curantis consilium debeat. Interest enim, non quae aetas sit, sed quae vires sint. Ergo, si puer imbecillus est, aut si mulier parum valet, male sanguis mittitur: Emoritur enim vis, si quae supererat, hoc modo erepta. At firmus puer, et robustus senex, et mulier valens, tuto sic curantur. Et febres quidem regionum calidarum non solum aliquando V. S. levantur, sed quoque in robustis eam nonnunquam adhibendam enixe requirunt.

40. Alii V. S. febres postquam intermiserint in remittentes vertendi arguerant; et eam numquam in intermittentibus veris adhibendam arbitrantur. Alii vero, et numero graviores, cum fructu, non solum in remittentibus

* *Northwest marine practice* t. 2, p. 224. *Sind on hot climates*

p. 274. *Clark on warm countries* 235.

t. *De re med.* l. 2, c. 10.

Sind on the remitting fever of Bengal p. 52.

℞. *Hillary Barbadoes* p. 22, et go. *Huck apud Pringle disp. of*
army p. 202. *Glume, letters on the W. Indies* p. 251.

x *Platerus Praxis* t. 2, p. 119. *Sind hot climates* p. 274.

Senac de febr: l: 3, c: 5. Pringle dip: of the army p: 200. Monro
military hospitals t: 2, p: 104. Flume, letters on the W. Indies p: 255.
Senac: l: c: Flume l: c: Monro l: c:
De re med: l: 2, c: 10.
Heister comp: med: c: 2, § 15, p: 25.

tentibus postquam apyrexiam plenam habuerunt*, sed quoque in intermittentibus, ab initio puris, venam secaverunt^x.

41. Opiniones ita diversae, medicis a singularibus ad propositiones universas ratiocinantibus, solum tribuendae sunt. Homo enim natura superbus observationibus propriis, licet exiguis et angustis, inniti, quam experientiae aliorum credere, mavult. Sed ne plura, quae sunt pene innumerabilia, confectè, comprehendam brevi: Sic enim statuo, viribus finientibus venaesectionem, nunquam vero nisi vi symptomatum coacti, adhibeamus oportere.

42. Tempus venam secandi in dubium venit. Jamdudum CELSUS observavit, quod, si vehemens febris urget, in ipso impetu ejus sanguinem mittere, hominem jugulare est.^x Et igitur dixit, expectandam esse intermissionem. Nonnulli recentiorum CELSO, numquam non spectando, consentiunt.^r Ratio tamen nulla est, quod ad hanc sententiam adeam. Nonne e re erit, durante calore, cum ex actione cordis nimia periculum aegri capiti immineat, ille sanguinis jacturam faciat? Exinde enim, non solum mala ante oculos nobis versata mitigamus, et quicquid boni in se remedium habet adpiscamur;

camur; sed etiam abhinc medicus in febribus malignis potitur temporis, quo, intermissione prima accedente, cortice uti possit; imo quinetiam febrem ad remissionem felicem, aliter non secuturam, perducatur. Et non solum haec dicitur sana ratio, sed etiam virorum celeberrimorum usus *.

43. Sed tamenetsi res ita se habet, eorum opinio minime sequenda est, quorum eo processit audacia, ut in frigore febrili venam secare ausi fuerint, quod sane absonum et periculosum; cum enim deprimatur pulsus, aut ferme dilitescit, cum vix circuit sanguis, cum spiritus vitalis obrui videtur, quid ex sanguinis missione sperandum? Quid non timendum?

44. Alii quidem V. S. rejicientes, veluti auxilium infidum, dixerunt aliter cum haemorrhoidum evacuatione rem se habere; et igitur evacuationem promovendam esse arbitrantur; tumoresque ad fluxum foliorum caricis frictione alliciunt. Ita eruditus Haenus raciocinatur. Ea verba: 'Quamvis multum absit, ut cum
' priscis medicinae patribus, unicum quartanae
' febris ab atra bili duceremus originem, inficiamus

* Senac de febr. l. 3. c. 9.; Cleghorn, Minorca, p. ¹²⁹~~122~~; Pringle, dis. army, p. 201. *astruc on fevers p. 71.*

7. Senae de febr: l: 3, c: 9.

8. De Haen vat: med: t: 3, p: 319.

9. Platerus prax: t: 2, p: 116.

Platerus prop. t. 2, p. 147. Riverius pharmac. p. 639.

Montanica comment. Wintering: t. 6, p. 42.

‘cias tamen nemo ibit, quin ab atra bili gigni
 ‘quartanam. Bilis autem atrae per haemor-
 ‘rhoidas evacuatione causa febrigigna imme-
 ‘diata, atque directe evacuatur, ut sic demum
 ‘febris cesset.’ Ad unam alteramve harum pro-
 positionum credendam, me hercule, non possum
 animum inducere. Remedium igitur, ob mo-
 lestiam, immunditiam, dolorem, periculum, et
 inanitatem, a me rejicio.

45. Medici diathesin phlogisticam cathartici-
 minuendam putaverunt. Tarde autem cathar-
 sis evacuat; subinde debilitatem universam, ac-
 tione cordis parum diminuta, gignit; nec effec-
 tus aequae evidentes unquam ac V. S. dat. Quo-
 circa, CULLENUM sequens, catharsin ad hunc
 scopum attingendum esse auxilium infidum, ar-
 bitror. Fatendum tamen est, eam in febribus
 intestina evacuando, egregiam operam saepissime
 praestare. Nec dubitandum est, quin aliquando
 lenia cathartica, ante paroxysmos adhibita, iis
 venientibus occurrisse visa fuerint; quod illa,
 quia lenia fuerunt, nullo alio modo, nisi diathe-
 sin phlogisticam auferendo, efficiebant.

46. Ill. Mead exiguum portionem rhabar-
 bari cortici admiscebat; ea scilicet ratione, ut
 alvus bis saltem quotidie dejiceret.† Qua ratione
 procul

procul dubio obstipatione occurritur. Obstipatio autem rarius durante corticis usu videtur, et nulla res tam ad eam removendam valet, quam enema salinum ano infusum. Alii ex cathartice cortice admistis diathesin phlogisticam minui crediderunt. Et alii demum potius, si intestina fordida fuerint, et tempus ad ea purganda defuerit, corticem adhiberi una cum cathartice voluerunt. ^{*} Nullum fructum hinc oriundum affirmare haud dubito. CORTEX enim ipsa, dum alvum solvit, nullos effectus tonicos edit. Et sane methodus sanandi haec, ab inani et futili theoria, meo iudicio, orta est. Medici enim, ne venena esset cortex diu intestinis haerens, metuebant!

47. Deinceps videamus, quatenus viscera obstructa, in febrium curatione, attentionem sibi vindicare debeant; sed, antequam de hoc aliquid dictum iri instituo, de eorum natura disserere, perpendet animus. Argumentum revera expeditu perdifficile. Saltem, mea sententia, auctores rationes horum parum aequabiles tenuerunt. Quod scriptis autem extat, duo huiusmodi obstructionum genera esse colligo; quorum unum longum, alterum acutum.

48. Morbus

* Geoffroy tract. de Mat. Med: t. 2, p: 188. Bianchi hist. hep.
p: 3, p: 287.

de re med: l: 2, c: 8; l: 3, c: 10.

Mat: Med: l: 3, p: 298.

Diseases of the army ~~at 2nd p. 149.~~ 214

48. Morbus jecoris longus CELSI^{*}, tumorum genus Haeni secundum, et *ague cake* PRINGLE^x, prioris generis sunt. Excipit febres, quae, saepius recurrentes, aegrorum vires plurimum fregerunt. Ecce signa. Dolor obtusus locis affectis sentitur, qui modo finitur, et iterum, praecipue ex pressura, vel post cibum intenditur. Praecordia dura sunt, et tument. Remediis infractus diu plerumque persistat; et ubi inveteravit, vultus fit plumbeus, cutis bile flavescit, venter et crura pedesque aqua intumescunt, et suppuratio cum febre hectica mortem plerumque infert.

49. An idem sit ille tumor, quem febres anno 1761—1763, excipientem videbat SYDENHAMUS, necne, satis discernere nequeo. Hic effectus valde diversos procreabat. Nam, inquit vir illustris, iis gradibus quibus hoc symptoma supervenerit, febris etiam fugam meditatur. Quodque de tenera aetate, quoad ventris tumorem ill. Sydenhamus scribit, id aetatem habere adultam eruditus de Haen monuit; hanc vero crurum oedema frequentius. Hic tumor igitur nihil aliud forte est, quam ex relaxatione durante febre aquae quantitas exigua in abdomen

D

infusa;

infusa ; quae, febre vel natura vel medicamentis coercita, facile iterum resorbetur.

50. Sed quod ad argumentum attinet, viscerum obstruções istae, quas modo praedixi, de sanguine in visceribus congesto existere habentur. Sanguinem, durante stadio algido, intus adigi, nullatenus dubito ; exindeque forsitan viscera intumescere. Sed nihil est, unde in visceribus jam obstructis haec fieri concedam. Cadaverum enim sectiones hepar lienemque multum mole aucta, quoad consistentiam vero et faciem immutata, ante oculos anatomicorum proposuerunt. ^{*} Vel si consistentia fuerit mutata, durior inveniebatur. [†] Quocirca vasorum compages, ex quibus constant viscera, numero augeri, prorsus existimo ; unde curatu ita difficiles obstruções ; licet enim febris, hos tumores excipiens, non semel ad nihilum redegerit ; est tamen fatendum, eos plerumque pejores ex singulis paroxysmis fieri. ^x

51. Hepatis et lienis inflammationem acutam quoque a medicis inter viscerum obstruções poni, mihi visum est. Inflammationes enim viscerum abdominalium saepe febres intermittentes excipiunt ; obstruçõesque hujusmodi aliquando comitantur inflammationes thoracis a-

cutae.

- * Morgagni de caus. et sed. morborum. Epi: 36, art. 17, 29.
 † Storck Ann. Med. I.: p. 85.
 x. Tison avis sur la sante' c: 18, 5262. Pringle diseases of
 army p: 210. Hume letters on the diseases of the W. India
 p: 254. Monro on Military Hospitals t: 2, p: 118.
 36. Celsus de med. l: 3, c: 10, l: 4, c: 8. Clegghorn diseases of minor
 p: 223. Macbitteria & p: inaug: p: 8. Blasin diseases of
 hot climates p: 274.

*. Fantomus Oles: Anat. med: p: 27. Morgagni de sed: et
caus: morb: Ep: 20, art: 2, 30, & 31.

x. Storck Ann. Med: I, p: 150.

†. Ibid: Ann: I, p: 94.

©. Meth: Med: ap. Glau: l: 2, c: 7.

cutae.* Obstructiones porro, cadavere infecto,
aliquando abscessus continere, aliquando sphace-
latae[†] inveniuntur.

52. His praemissis, statuendum est, quid in
februm curationem auctoritatis habeant istae
obstructiones. Quaestio caliginis multo ob-
ducta. Alii enim asseruerunt, febres, existente
abdominis tumore, non sine periculo depelli.
Alii contra magna auctoritate pollentes arbitran-
tur, tumores semper ex paroxysmis ingravari;
exindeque suadent, ne pergere sinerentur. Con-
troversiam judicare, nequaquam in me recipi-
am; sed conspiciendo animo, qui sint obstruc-
tionum exitus consecuturi, distractas opiniones
in concordiam reducere, tantum quantum pos-
sum, conabor.

53. Animadvertit jamdudum GALENUS,^o ob-
structiones istas difficillimas esse curatu. Et pro-
fecto non Apollinis [magis verum, atque hoc,
respondum est. Si ergo, dum homo a febre et
simul visceribus obstructis laboret, priorem illi
dempserimus, et si hydrops, icterus, et cachexia
supervenerint, nonne haec potius ad affectus
naturam, quam febris defectum, tribuenda sunt?
Si ergo febris inveteravit, et hypochondria tu-
ment, morbusque singulis paroxysmis ingrave-
scit,

fcit, procul dubio febrī occurrere quam primum
fapiētis est. *

54. Unde igitur medici, se paroxyfmis fuga-
tis multa mala vidisse apud obstructione vexa-
tos dixerunt? ✕

55. Nisi me fallit animus, in hoc saepe fuit er-
ror, quod humores in intestinis corrupti, ab il-
lis obstructiones habiti sunt; v. g. SWEITENO *.
Nam ubi res postulat, mala multa ex intestino-
rum colluvie, febre depulsa, exoriri ostendam.
Hoc plures fefellit.

56. Alii rem accuratius perpendentes, nihilo-
minus febre fugata, effectus obstructionum ne-
cessarios aspicientes, illa in febris desiderium
contulerunt, quae morbi indoli solum tribuere
debebant.

57. Alii demum, praejudicio abrepti erga re-
medium haud ipsis consuetudini ascitum, ob-
structiones inducendi corticem arguunt. Opi-
nio iniquis fundamentis nititur; et igitur nihili
aestimandum est.

58. Neque tamen vanum est, quod vulgo di-
citur, aliquas esse febres benignas, imo et sa-
lutares, nempe quae obstructiones viscerum sen-
sim

* Comment. tom. 2. p. 564.

- * *Tosti Ther: spec: p: 91. Sweiten comment: in aph: 767, t: 2, p: 565.*
Werthof obs: not: 6, in Mag: 182. Tifotaxis sur la santé c: 18, § 26.
Eleghorn Minorca p: 203, & 224. Chalmers diseases of S.
Carolina t: 1, p: 181. Fullen Pralect: De Haen Nat: Med: t:
p: 911. Stork Ann: Med: II. p: 57. Lind Bengal fever, p: 64.
Flume Letters on the disp: of the W. Indies p: 254. D. Monr
Military hospitals t: 2, p: 118.
 * *Mead Mon: Med: edita Olmringhamio c: 1, sect: 8. Sweiten*
c: c: p: 564. Senae de febr: l: 4, c: 6, n. Pringle disp: Army
ed: 2, p: 179.

* Hippoc: aph: seit: 7, § 52. Gelsa l. 2, c: 8. Sweiten aph:

754, 767.

x Sweiten aph: 767. Werthof de febr: p: 65. Hasten holby
apud Halleri diaph: med: pract: 4: 5, p: 77.

o. Cleghorn Minorca p: 223. Glash warm countries p: 180.

§ Cleghorn l: c: p: 212.

*
 fim expediunt, neque vero ultra modum affligunt, aut debilitant. Et quoniam natura remedium vix ejusmodi affectibus tribuit, in his, ad aliquid antidotum statim procedere, minus forte aliquando salubre foret. x

59. Suspicionem vero adeo multorum medicorum firmantur opinione, ut illas esse veritati alienas affirmare non auserim. Et quidem percipi potest, quomodo obstructionibus aliquibus, a remediis tonicis injuriæ oriantur. Intuta enim, imo etiam nociva sunt tonica, ubi in regionibus frigidis inflammationes acutæ adsunt. Sub Sole calidiore autem, inflammationes acutæ debilitate sæpe comitantur, et paroxysmis singulis irritantur; unde tonicorum auxilium ex tempore invocant. Et, febre fugata, remedia ad malum medendum in usum vocari possunt. §


60. His de obstructionibus dictis, amplius de illarum sequelis, v. g. hydrops, icterus, &c. verbis tempus terere parum necessarium duco. Opera jam data, ut febrium curationem viscerum obstructionibus, nisi diathesi phlogistica comitatis, haud impelli, palam facerem; rationem eas medendi silentio tradam, quoniam ad propositum haud attinet. Licet enim appareat, in plerisque quartanis diuturnis, vitia organica subesse;

subesse ; ex quo tamen minime consequitur, quoad ad quartanas febres, nihil cum recta ratione adhiberi possit, quam quod ad glandulas referendas valet *. In hoc enim medicus aequè sapienter officio suo fungeretur, ac si in cordis valvularum ossificatione, ad duritiem emolliendam, aquam in pectore fluctuantem evacuet.

61. Sed, quoniam de eo genere malorum dictum est, quae ad febres tantum nonnullas spectant, et quorum causa semper vitari potest ; deinceps de intestinorum colluvie, quae ad universas, quaeque ad febrium omnium initia pertinet, et de qua porro certiores sumus, magis grate disputandum est. Medici autem officiorum, ad humores corruptos in intestinis haerentes spectantium, partim ejusmodi sunt, ut ad febris naturam pertineant ; partim humores ipsos ut attingant. Danda igitur est opera, omnino si possit, utrisque, nec minus ut etiam singulis consulatur : Sed ita ut ea res aut profit ambobus, aut certe ne obsit alterutri.

62. Superiorum seculorum medici, quos hodie barbaros appellant, tam confuse de hac re scribunt,

* Schulz de usu mercurii. Apud Halleri disp. med. pract. t. 5, p. 108.



1. Hippoc: De loc: affect: p. apud Foes: 520. Celsus
lib: 3, c: 4; Morton Opera t: 2, lib: 1, cap: 6, p. 58, 59.
Forti Th: Spec: p. 99; De Haen Ratio medendi
t: 3, p. 316; Stahl de Feb: tert: reced: nat: apud
Halleri diop: med. pract: t: 5, p. 20.

scribunt, et multiplicem curandarum febrium descripserunt rationem ; tamque varios purgationum, pro humorum diversitatibus, a quibus febres nasci crediderunt, modos proposuerunt ; quibus scatent integra febrium curandarum volumina ; ut, si quis ea imitari vellet, aegro curam incertiore redderet, quam si totum negotium naturae committeret, quae per se sola ad febres huiusmodi sanandas saepissime sufficit. Ideo sine discrimine intestinorum purgantibus uti, a viris celeberrimis omnium seculorum institutum, inane, imo nocuum esse censetur. [†] Quorum autem usum, qui in universum vituperat, haud sane intelligo quidnam sit, quod laudandum putet. Licet enim adeo circumscripse monuerim, non esse danda, nisi intestinorum id posceret impuritas, intestinorum evacuantia ; hoc autem tempore nobis declarandum est, febres vix et ne vix quidem unquam sine intestinorum colluvie in initio occurrere.

63. Multa ad impuritates gignendas conspirant. Febres saepissime in locis et temporibus ad bilis praeter modum generationem proclivibus grassantur ; insuper crebro diaetae erroribus inducuntur, et populum plerumque concoctu difficili cibo onustum aggrediuntur.

64. *Ægris febre praesertim remittente laborantibus, si statim ab initio non sumpserunt evacuatorium, accedunt capitis dolor, stupor, et vertigo; angunt anorexia, nausea, oris amarities, et anxietas; foedantur cutis, et lingua, volvitur per abdomen flatus; tument hypochondria; inflatur ventriculus; et urgent cardialgia, ventris tormina, vomitus, et diarrhoea biliosa.* ☉
Haud igitur mirandum est, si mala adeo numerosa, morbo jam gravi superaddita, incrementum illi gignerent, eumve curatu difficiliorem facerent. Et summa quidem auctoritate medicorum* dicunt, omnium rerum nec aptius esse quidquam ad febres debellandas, mitigandas, et curatu faciliores faciendas, quam intestina evacuare.

65. Natura sane ad humorum corruptorum evacuationem viam monstrat; durante enim stadio algido, plerumque vomitus ultro accidit, qui ad propositum perficiendum saepe sufficit. Idcirco perspicuum est, quod si in corpore, causa, qua expellendi sunt, directa, humores isti corrupti residere sinuntur, multum instabit periculum. Et dicta experientia firmanatur. Dum enim intestina multis impuritatibus onerantur, non sine difficultate maxima, imo et summo periculo,

*. Senectus op. t. 2, p. 100. Boerhaave Epist. ad Bestand
apud Monchy disp. N. Indies § 66. Schacht praect. ap
ind. Senae de feb. t. 3, c. 637. Hillary disp. of Barb
:oco p. 22 & 90. Haastenholtz consec. theot. praect. ap
Halleri Disp. Med. praect. t. 5, p. 72. Heister compen
Med. praect. c. 2, § 12, p. 23. Pringle Obs. on the diseases
of the Army p. 202 et seq. Glesphorn Minoria p. ²⁰¹~~200~~
Storck Ann. Med. I, p. 52. Lind on hot climates,
277. Monchy on diseases of the N. Indies,
67. -

O Glesphorn minoria 200.

Bianchi Hist. Rep. p. III. p. 287. Gifford Mat. Med. p. II
p. 138. Gifford Minora p. ~~222~~²²¹. Stoth Ann. Med. t. p.
54. Saunders on the Red Peruvian Bark p. 42.
Gifford ibid. p. 211

periculo, paroxyfmi occurrendi funt *. Et ab-
hinc magnus mihi animus eft, hoc caufam fu-
iffe praecipuam malorum illorum, quae ufum
corticis in vifcerum obftructionibus fecuta effe,
dicta fuerant. Dubitantesque ad Sweiteni com-
mentarium relegamus †. Quamobrem, ut eme-
tica, et cathartica fere nunquam, nifi impuri-
tatum fignis indicantibus, danda funt ; ita, his
fignis fe oftendentibus, ab iis temperare incon-
fideratum et periculofum plerumque foret. Si
autem fpes in angufto funt, et mors primo pa-
roxysmo expectatur, ad remedium, quo certifi-
fime praecaveri poffit, ftatim, omnibus aliis poft-
habitis, confugiendum eft. Paroxyfmisque mi-
tigatis vel fugatis, fatis tute intestina purgari
poffunt. §

66. Deinceps de modo, quo intestina pur-
ganda, dicendum eft ; utrum fint meliora eme-
tica,

To join the bark to wacuan
o.

* Mead monita med. ed. Wintring. t. 2. p. 41. ;
Werholf obf. de febr. p. 63. ; Caretheufer mat. med.
t. 2. p. 540. ; Swieten comment. aph. 758. ; Senac
de febr. l. 3. c. 7. et 8. ; Pringle dif. of the army,
ed. 2. p. 206. ; Stork ann. med. i. p. 52. ; Collin
ann. med. iii. p. 28. ; Lind, Bengal fever, p. 58. ;
Clark, warm countries, p. 144. *Pringle edo 70 p. 14.*

† Aph. 767.

tica, an meliora cathartica? Tanta est inter medicorum de his sententias, quanta maxima potest esse distantia. Omnium igitur sententias recensere, minime mihi est in animo. Dicam solum ut sentio.

67. Emetica plerumque esse efficaciora putantur (68.), eodem tempore, quoniam obstipatio et bilis in intestinis quantitas praeter naturalem saepius adsunt; necessarium habetur, una cum emetico adhibere catharticum nonnullum, ea scilicet ratione, ut alvus bis terve deiceret. Si vero emetici usus debilitas viscerumve inflammatio obstant, ad cathartica sola confugiendum esse, omnes arbitrantur. Opinio mea fert, hunc esse modum, quo medici celeberrimi impuritatibus intestina vacuefecerunt.* Alii autem propensiores ad vomendum,[†] alii ad alvum ducendum, videntur.^o Nihil autem ex his esse perpetuum; sed curantis consilium ad aegri ipsius statum potius dirigendum, in mea sententia est.

68. Et emetica, quoniam ventriculum et duodenum, omnium impuritatibus maxime onusta, evacuant, efficaciora opinamur; itaque semper purgantibus longe praeferenda; semperque, si opus ad intestina evacuanda fuerit, nihil admodum

- + *Elephorn Minoria* p. ~~201~~. *Senae de febr.* l. 3, c. 7. *Haist*
compend. med. pract: c. 2, § 12, p. 23; c. 7, § 13, p. 24. *Pringle*
diseases of the army p. 202, p. 204. *Fluck a head ilud.*
 p. 203. *D. Monro on Military Hospitals* t. 2, p. 24.
Sind on the Berged keer p. 60. *Clarke on the*
counties p. 144.
- + *Gohausen Edinth Med^l Essay* t. 4, p. 393. *Murray app*
simplic. t. 1. -
- ©. *Thonigius Reg. Veget.* sect. 4, p. 281. *Elephorn Minoria*
 p. ~~201~~ 202.

* Platerus proae: med: p: 129.

+ Hic:

o. Hedman Edint. Med. & Phys. f. 4, art. 5.

4. Platerus lxx: cit: Waldschmidt prax: med: itation: p: 84y.

Petzoldus Act: Berolin: Dec: 1, pars I, p: 37.

5. Senettus Opera t: 2, p: 130.

§ Suresiter com: in Aph: Proeth: 759. Baldinger Med:
comment: t: 5, p: 57.

modum contradicente, adhibenda. Multa in usum vocata sunt, scil. chamaemelum,[†] raphanus,[†] erigerum,[⊙] asarum,² et helleborus albus;⁵ sed ante omnia ipecacuanha, et ANTIMONIUM. Duo, quae promime nominavi, munere omnium facile funguntur.

69. De nonnullis placitum est,⁸ ut ipecacuanha uterentur. Nec dubitandum, quin ex hac ventriculus et duodenum evacuari possint; licet ex ipecacuanha, quam ex antimonio, hoc minus efficaciter, et minus expedite, factum ire arbitrator. Neque ad alvum solvendam aequae facile ipecacuanha, ac antimonium, administretur. Exinde medici inter recentiores auctoritate gravissimi antimonium praecipue, febrium initiis adhibent*.

70. De terrore, quo illi, qui antimonii quantitatem sane metuendam quondam videbant adhibitam, perculsi erant, nihil miror. Contra autem antimonii detractores, qui nunc id, caute adhi-

* Waldschmidt p. 849.; Morton op. t. 2. ex. 1. c. 8. p. 102.; Senac de febr. l. 3. c. 7.; Callenus; Werholf obs. de febr. p. 65.; Heister, comp. med. c. 2. § 12. p. 23.; Pringle, dis. of the army, p. 202.; Dr. Monro, military hospitals, t. 2. p. 84.; Lind, Bengal fever, p. 60.; Clark, warm countries, p. 145.

adhibitum, remedium fuisse præsentissimum et tutissimum viderunt, veritas ipsa me una cum celeb. Sylvio exclamare coegit. Non enim sunt audiendi asini de lyra iudicium laturi*.

71. Forma sub qua optime antimonium adhibetur, est ubi calci purae acidum tartari superadditur. Hujusmodi est TARTARUS EMETICUS P. E. Cl. Lunelius nuper emetici formulam, a dicta non multum discrepantem, academiae pharmaceutices Parisiis proposuit. Vitro antimonii, antequam crystallis tartari adjiciendum, nonnihil acidi vitrioli affundit; quo lota, calx purior fit.

72. Quod si revera non tantum superiora, sed etiam inferiora intestina, a colluvie liberare, (in plerisque necessarium), cupiamus; utraque commodè et facile obtineri possunt, salis cathartici alicujus solutione, quae tartari emetici circiter gr. i. in se habet. ^x Emeticum ita adhibitum est Gallorum *l'emetique en lavage*. Non solum ex eo certius purgatio per alvum producet, sed etiam per os. Hinc enim catharsin, alias non secuturam, gignit antimonium, etiam celeberrime repetitum. Porro, urgente periculo, tute
sic

* Meth. Med. l. 2. c. 10. par. 43.

x Hoffmann Opera Med: 4: 2, p: 114, § 7. Pringle on the
dis: of the Army, p: 204. Fluchard Pringle p: 203
Black & White countries p: 114.

x *Plaghorn Minoria* p: 202.

Cætera de genere hoc adeo sunt multa loquacem
de lafore valent Fabium - Nov. Sat: l: 1. s: 1. 13.

fic intestina brevi tempore evacuantur, ita ut CORTICE, prima remissione accedente, frui liceat.

73. Cum vero, incipiente febre, vomitorium ob intestina inflammata invocare non licet, cathartica nequaquam omittenda sunt. Medici veteres febrium curationem ita catharticorum impleverunt, ut si omnia recensere vellem, omnia quae medicamentariorum officinae continent, enumeravero. SALES NEUTRI autem, SENNAE folia, et TAMARINDI, praecipue in febribus versantur, et ad propositum satisfaciunt; ^xquare caetera praeteribo.

74. Medici aetatem omnem, ab initio rerum usque ad instantem, in litibus de purgandi tempore contriverunt, et tamen inter se adhuc quam maxime dissentiunt. SYDENHAMUS quidem volebat, medicamentum quatuor ante ipsum paroxysmum horas tentare. Ita autem abfuit ROSENSTEIN ab emeticis ante accessiones adhibitis, ut ea potius statim post proxysmum usurparet. Sed usus ostendit, ut jam de venaesectione monuimus, nihil ex his esse perpetuum, aliasque potius observationes adhibendas esse, ad quas dirigere curantis consilium debeat. Interest enim non quid febris tempus sit, sed quid medico temporis

poris superest. Ergo, si tonica prima remissione danda sunt, commode, durante paroxysmo, per os intestina purgantur. Imo etiam in febribus, ad continuas appropinquantibus, remissio, non nisi ex intestinis colluvie levatis, expectanda est. Eodem consilio statim post paroxysmum, intestinorum purgantia adhibentur. At, si tempus superest, evacuatio tuto intermissione postponetur; et medicum oportet, paroxysmo finito, quietem aegro det.

75. Jam remedia, durante paroxysmo, applicanda recensere progredior. Nec consilium curantis in stadio algido, ab illo, durante intermissione, mutari arbitramur. Et revera eadem fere hic atque in intermissionibus usurpantur. Sic placuit medicis stimulantia impertiri; scil. piper,^{*} serpentaria Virginiana,[†] vinum,^x alkali volatile,[§] et rubefacientia.^{//} Plerumque autem, licet frigus acerbum videatur, et pulsus etiam vix percipi queat; tamen, quoniam actio vasorum brevi incrementum acceptura est, prudentiores stimulantia saepius praetereunt. Si vero aeger, funesto algore correptus, quasi moribundus et languens per plures horas jaceat, et si calorem vehementem superventurum haud liceat expectari, actio vasorum quam citissime vino, julapiiive spirituosius,

* Riverius *perp.* Med. p: 338.

†. Morton Op: t: 2, Ex: 2, c: 7, p: 189.

x *ibid.* Ex: 3, c: 6, p: 57.

§. *ibid.* Cullen *Met.* Med. p: 385.

|| Morton Op: t: 2, Ex: 2, c: 7, p: 188.

*. *Find on the diseases of hot climates* p: ~~227~~ 308.

x *Nucius prap: Med: p: 338. Morton Op: t: 2, l: 2, c: 7, p: 185.*

+ *Hoffmannus Op: t: 2, p: 14, § 6.*

§ *de re med: l: 3, c: 12. Greshorn Minore p: 107*

spirituosis, et salium volatiliū repetitis dosibus, promovenda est.

76. Sales neutres porro, sed maxime effervescentes, durante algore, adhibuerunt medentes, et fertur magno cum fructu, ob vim quam ad paroxysmos mitigandos habent.* Experientia tamen adhuc manca, et modus, quo aër mephiticus operatur, incertus me detinent, ne ultra rem perpenderim.

77. Antispasmodica demum, durante algore, adhibuerunt medici; opium^x nempe et aetherem vitriolicum[†]; et tutiora stimulantibus plerumque existimantur. Nonnulli tamen, ob noxas ab illis gigni creditas, antispasmodica (135.) ablegant. Nec in me fuscipiam, de febrium statu, in quo convenient, discernere.

78. Stadio algido desinente, vomitio sponte saepe accidit, quae calorem plerumque gignit. Et igitur CELSUS voluit, quum primum aliquis inhorruit, et ex horrore incaluit, dari ei potui aquam subfalsam, et vomere eum cogi[§]; et profecto febris saepe sic discutitur. Alii potius ad emetica fortiora confugerunt; inter omnes vero eminet ill. Thomson, qui per annos viginti eo febris tempore, emetica, non sine magnis laudibus, praebebat; imo etiam omnem spem salutis
in

in eorum virtute ponebat. ^{*}CULLENUS quoque ipse, qui quid sit pulchrum, quid turpe, quid utile, quid non ostendit, emetica, secundum Thomson rationem adhibita, laudat. His dictis res ultra dubium posita videri potest. Alii autem, et ne quidem parvi nominis, dissentiunt; non enim, aiunt, tunc tentari emetici debere, licet vomitione spontanea et nausea indicari videatur; quippe anxietates tantum et dolores acerrimos inferre possunt emetica; et ventriculi subversionem quamlibet, aiunt porro, nisi per aquam calidam solam formidandam esse. Pernitium inter has sententias interest, ut ullo modo reconciliationem admittant. Nec inter tantos dijudicare in me recipiam.

79. Cel. Lind miris laudibus praedicabat clarius opii exhibendi rationem quam tamen nonnulli antea usurpaverant. Vir egregius autem, felici cum eventu, in stadio febrium calido, fervore urente, capitis dolore, et summa anxietate comitato, opium dabat. Nec unquam, nisi delirium adfuisset, ullum malum hanc rationem sequens videbat. Et, licet febres hoc modo minime discuteret, attamen eas multo leniebat.[†] Et sententia Lind, experientia Saunders approbari videtur.^x Praeclarus autem D. Monro,

* Med. Essays 1: 4. p: 393.

+ on the diseases of hot climates p: 319.

+ Essay on the red Peruvian Bark p: 52.

*

* on military hospitals t:2, p:122.

+ Op: t:2, l:1, c:6, p:55.

x Home princip: med: p:100.

§ Epist: 3.

o Sydenham Op: p:96

2. Boerhaave aph: de cogn: et aut: morb: 764. Morgan
Neehan: practice of Physic p:178. Heister comp: Med
Pract: c:2, §17, p:29.

Monro, licet fateatur aliquam vim ad paroxysmos mitigandos opio inesse; tamen ejus virtutes multum intra famam esse expertus est.* Et insuper opiata, ⁿmomento MORTON, paroxysmum legitimum haud raro in apoplexiam, vel alium aliquem peracutum morbum, convertunt.[†] Nihilominus fatendum est, medicos miris praejudiciis contra opium abreptos esse; nec dubito, quin in hoc rerum statu eosdem effectus praestare possit, quos postea enumerabo (91.).

80. Ubi sudore paroxysmus solvitur, referuntur prodesse remedia blande et diu sudorem promoventia. Et vere, si non transit remittens in intermittentem, debelletur forsitan sudatoriis haud calefacientibus in sudoribus criticis.^x Sed hoc in Veris intermittentibus, praecipue quotidianis, fere solum obtinet; quia in his praesertim adest diathesis phlogistica. Nec ullo modo credimus sudatoria prodesse, nisi quatenus diathesin illam removeant. Huicque solum tribuendi sunt effectus egregii, quos edidisse sudatoria referuntur.^o Sed, monente SENECA,[§] utrumque vitium est et nulli credere et omnibus; quare ne nimium crede omnibus, quae de sudatoriis medici dixissent. Omnes fere enim in illa fuerunt opinione, febrilem materiam hac via de corpore

F commodissime

commodissime eliminari; quinimo et multi crediderunt, auctis his sudoribus, posse expelli etiam illud, quod manens in corpore sequentes paroxysmos renovaret. In hoc tamen vanam rationem secuti sunt; quippe dubitari nequit, quin, sudore exundante, exhauriantur corporis vires; et quin stragulis congestis, vel potu calidiori hausto, saepe major excitetur calor, et delirium aliaque mala inducantur.^x Et porro patuit ex SWEITENI[†] dictis, omnium difficillime curari febres intermittentes in illis hominibus, qui sudoribus quam maxime diffluunt.

81. Restat solum ea pars, quae febricitantis regimine continetur. Atque, durante stadio algido, nonnulli censuerunt, aegrum multa veste indutum prope caminum luculentum esse sedandum; vel potius ambulatione citatiore exercendum.^f Alii vero arbitrantur, id tutius et melius esse, quod in paroxysmos se lectulo aeger mox committet; quia languor, lassitudo, et dolor artuum capitisque, ad hoc suadent.^o Cum prioribus, viris equisque, ut dicitur, si aegrorum commodum tueri et consulere sententia est, decertandum est. Constat tamen inter omnes, quod, accedente calore, mox se aeger lecto contineat, et omnigenum irritamen, praesertim autem calorem,

x denae de febr: l: 3, c: 9.

† comment in Aph: 764.

§ Norton op: t: 2, ep: 4, cap: 6, p: 54. Astruc on Fever, p:

© Swieten comment: in Aph: 763. Heister comp: med: c: 2

§ 17. p: 20. Eleghorn minorca chap: 3. Prosenlein
diso: of children p: 214.

~ Rosenstein p: 214. Gledhorn Minorca c: 3. p: 186
+ ibid. Morton op. t: 2, art, c: 6, p: 54. Swieten comment.
in Aph: 763.

* *Lecons de med:* l: 3, c: 11. Gledhorn on the Diseases of
Minorca p: 18⁶. Astruc on fever p: 70, Rosenstein of
Diseases of children p: 214.

§ *Lecons* l: 3, c: 6. ~

o Gledhorn Minorca p: 192.

o ibid.

lorem, de conclave angustiore^x, de stragulis pluribus, vel de igne, evitet. Dum autem perstat albor, stragulorum affuetis plurium opus est; et imo etiam, si rigores fiunt vehementiores, ampullas aqua calida oppletas ad pedes applicari. Ubi vero febris decrevit, et sudore corpus madescat, tunc quidem stragulis nequaquam operiendus est aeger; sed aliquandiu sudet placide et quiete. At, cum ex sudore molesta sentiscit, leniter et caute cohibendus est sudor potu frigidior, manibusque sensim nudatis. Et, ubi sudor exantlatus fuerit, sedule mutandum aegri indusium est.^o

82. Quemadmodum febricitantes cibum nihil appetunt, ab eo prorsus abstinendos esse existimo.^o Febris autem sitim arentem accendit; de potione igitur ingens pugna est. Ubi enim frigus expectatur, monemur a plerisque omni potione prohibendum esse aegrum; haec enim, ut dicitur, paulo ante data multum malo adjicit, ventriculum opprimit, et anxietatem auget.^{*} Et porro monemur, docere aegros, ubi febris conquieverit, protinus sitim quoque quieturam, longioremque paroxysmum fore, si quod ei datum fuerit alimentum; ita celerius eum desinere sitire, qui non bibit.^s Demumque mo-
nent,

nent, ut sitim fructibus acidis, vel os eluendo, fedent^q; quae, quin aliquando valeant, nullatenus dubito; sitis enim a salivae secretionē impedita aliquando pendet. Ubi huiusmodi causa obtinet, potio forte supervacanea, imo periculosa fuerit. Si vero liquorum gastricorum secretio sit impedita, accenditur sitis, quam nihil praeter aquam compescere potest. Et nunquam nobis fidem faciunt, malorum quae aquae potionem moderatam secuta esse dixerunt. Potus sufficiens ergo tenuis, et tepidus, aegris aliquando, pro sitis ratione, non solum non dene-gandus est, sed potius commendandus; quique tamen non affatim aut praecipiti modo, at modicis haustibus, sensim sensimque ingerendus est.*

83. Retinendum etiam, durante stadio calido, potum aegro Asclepiades putavit, sic ut ne os quidem primis diebus elui sineret. Et CELSUS ipse existimavit, primo die nullum dari humorem debere.* At illud quidem ab Heraclito Tarentino dictum majus rationis habet, febrem nempe leniri, nec unquam augeri, per modicas potiones.^s Hispani autem et alii non potui aquam dant, priusquam febris in summum incrementum advenerit. Plerique tamen melius nullam

* Heister Comp: med. Jurat: c: 2, § 4, p: 30. Tifot av.
an peuple c: 18, § 264.

+ Celus de re med: l: 3, c: 4.

x ibid c: 6.

§ ibid -

o Blegborn of the diseases of Minora p: 188.

▷ Rosenstein on the Diseases of children p: 215.

♀ Blegborn Minora p: 107.

* Fleghorn on the diseases of Minorea p. 190.

+ Felsons de re Med: l. 3, c. 6.

c. The proper drinks during the hot fit are those w^h all
eat dissolve & acrimonious particles of the b^d & convey
thru the kidneys & pores of the skin &c. Fleghorn Minorea
189.

D Fleghorn Minorea 21,

nullam cautionem exigunt; sed putant, aquam praestandam esse, ut bibat aeger, non affatim quidem, sed sensim usque ad libitum.

84. Quaestio est per totum orbem terrarum notissima, an potus frigidus, an calidus adhibendus est? Nec tamen a CLEGHORN dissensio, qui, de more Hispanorum, condecebat aegrorum votis, dando aquam frigidam peroptatam.* Ubi febris decrevit, aliqui sudorem potu calido promovent; ineptam tamen rationem sequi mihi videntur. Enim sic vires aegrorum convelluntur. Credo melius esse, potum temperatum adhibere, et solummodo frigus repentinum vitare.

Thin of Drink

85. De paroxysmis avertendis valde considerandum est; omnium enim rerum nec aptius est quidquam, ad febres debellendas, quam paroxysmos averti.^d Hinc enim aufertur causa, qua paroxysmi futuri sequuntur (22.). Duplex omnino occurrendi genus est, unum cordis et vasorum motum vel frequentia vel viribus auget; alterum corpus minus ad impressiones proclive facit.

86. Inter remedia, durante apyrexia, danda, considerari victus et vitae regimen veniunt; quae semper multum juvant, et per se recidiva prae-

praecavendo omnia longissime exsuperant :
Medicamenta enim effectus edunt nimis fugaces,
et, longum adhibita, nauseam faciunt, ita ut,
instante periculo, iis frui aegris miseris negatur.
Porro, ubi relaxatio in diuturnis obtinet, nihil
fere, praeterquam victus et vitae regimen, ad ro-
boris redintegrationem valeat.

87. Et ante omnia quaeritur, qua aëris rati-
one aeger continendus sit ? Et cum satis con-
stat, paludum miasmata nocere aegris, et fe-
brem, jam oppido paulum sopitam, inde saepis-
sime renovari ; conducet AER PURIOR, et no-
xiis effluviis liber. Et quisquis, etiam parum in
regionum calidarum, et in paludes pronarum,
febris versatus, noverit plurimos, qui non
prius convaluerunt, quam mutato coelo, et in
locum salubriorem secessu, causam febris remo-
tam vitaverint. Et vix quidem credat ignarus,
quam brevi aegri febris pessimis laborantes
vires redintegrant, etiam parvo curae adhibito,
si ita in locum ficcum vel ad mare magnum se-
cesserint. *

88. Quod ad cibum vero pertinet, Asclepiades
febres inedia curare professus est ; in quo va-
nam rationem secutus est. Abstinentum enim
a cibo, non nisi in primis diebus est ; et id e-
tiam

*Line on the health of seamen p. 85. On hot climate,
Euphorbia minorca p. 221
+ Felous de re medica l. 3, c. 14.

* *Elonox de re medica* l: 3, c: 4.

+ *Morton Op: t: 2, Ep: 1, c: 8, p: 103. Werthof p: 94. Gullen*
first lines cccxxi.

x *Sydenham Epist. respons: apud Op: p: 206 Rosinstein*
on the diseases of children p: 216.

§ *Sydenham l: c: - Bleghorn: p: 196.*

|| *Gullen Mat: Med. p: 38. - Bleghorn is of a diff: opinion*
vide Minerva p: 193

tiam hac sola lege, nempe, ut diathesis phlogistica urgeat; quoniam ex imbecillitate summum est periculum. In remittentibus quidem, aegri cibum, praesertim animale, raro appetunt, et ventriculum nauseantem cibo onerare semper periculosum est; quare hi a cibo magis idoneè abstinent. Si autem aliquod appetunt, iis concedendum est, etiam manentibus febris reliquiis. Cum enim viribus opus est, et satis temporis non restat, satius est principium concoctionis a decedente febre, quam reliquias ab incipiente, excipi. At in intermittentibus veris absurdum est, ubi cibi appetentia valet, diaeta parca et tenui aegros circumscribi. Fructus tamen horaeos et similia vitari oportet; itaque vescatur aeger CARNIBUS eupeptis, et PANE bene parato.

89. Abhorremus vina tenuiora, et omnigenam cerevisiam, PORTER excepta; fermentationem enim in ventriculo subeunt, exindeque infirmant. Sed pro potu ordinario anteponimus omnibus AQUAM puram et frigidam; ventriculum enim optime roborat, sitim temperat, et ciborum concoctionem promovet. Nec a LIQUORE VINOSO arcendus est aeger, qualiscunque is fuerit, qui ad ventriculum facit. Lata enim

enim edocemur experientia, quantum ad effectus miasmatum praecavendos valent hi liquores generosi; et insuper his solis aegri nonnunquam restituuntur, etiam ii, quorum corpora vim corticis perpetue eludebant.

90. Atque porro ineptum est, in intermissi-
onibus aegrum in lecto, vel cubiculo, vel domo
detinere, nisi ita frigus vel miasmata vitari pos-
sint; at exerceat se aeger in aëre temperato.
Id tamen non adeo agendum existimamus, ut
aegri fatigentur, vel ut calori aut frigori sum-
mis exponantur, praecipue si febres ad remit-
tentium indolem accedant.

91. Jam differendum est de remediis, quae
inducendo fibrarum moventium conditionem,
minus impressiones externas sensuram, accessio-
nibus obstant. Si enim homines, qui fibras
maxima vi contrahentes habent, quoque omni-
um minime irritabiles sunt; nonne propositione
inversa, videbimus, irritabilitatem minuendo,
nos vim contrahendi simul augere? Idque eo
magis dicitur sana ratio, quo morbi, a mobili-
tate solum pendentes, saepe roborando fanan-
tur. Porro, in accessione semper adesse coar-
ctationem vasorum minorum jam dixi, ejusque
causam ad sensibilitatem nimiam retuli (16.)

Plura

* Lind on the health of seamen p: 73 et seq:

x *felous de ore nud*: p. 3, c: 14. Morton Op: 4: 2, Ep: 1, c: 8, p: 16
Swieten comment: in aph: 758. Werlhoj Ob: de febr
p: 94.

† *Gleghorn Minorca* p: 476 192

- * Platerus prax: med: p: 148.
- † Senae de febr: l: 3, c: 11.
- > Dresing Dip: de valet: offic: Lin: Erlange 1776 § 23.
- § Riverius prax med: p: 639.
- || Dippelius tract: cui titulus In vitæ animalis morbo
et medicinae p: 70 et seq: Cullen Mat: Med: p: 376.
- o Schulz de febr: curat: antiq:
- D. Prax: med: p: 639
- ♀ De febr: l: 3, c: 11.
- 2 ann: Med: I, p: 55.

Plura autem febrium symptomata hacce coactione oriuntur (17.); nec dubitandum est, quin, ejus causa sublata, symptomata haec citius ad cursum sese meditabuntur. Remedia igitur enuncianda, apta, saltem ad paroxysmos levandos, videntur; et quicquid paroxysmos breviores et mitiores reddit, intermissiones longiores, et etiam morbi solutionem, producet (22.).

92. Consilium praedictum impleri ab hyoscyamo, ^{*}camphora, [†]valeriana, ^xopio, [§]croco, et oleo animali, ^{||}opinor. Omnium tamen opii vires et effectus ab usu optime experti habentur; de illo igitur solum nunc in animo est aliquid dicere.

93. Nec nova res est opium adversus febres intermittentes usurpare; sed varia ejus praeparata, praesertim theriaca, antiquissimo etiam tempore arriserunt. ^eRiverius autem, ²SENAC, et ²Stork, licet fateantur, aliquam in opio esse vim ad cohibendos febrium paroxysmos, tamen monita adjecerunt; hoc enim remedium non nisi summa cum cautione usurpandum esse arbitrati sunt. Testaturque ill. Stork, se hanc methodum in multis aegris magna cum attentione adhibuisse; vix quiquam febre liberati sunt, sed omnibus fere opium induxit, temulentiam,

tiam, et plerisque paroxysmos fecit longiores, atque alvum constipavit. Contra cel. Berryat, anno 1765, laudabat opium pro novo ad febres remedio; quo jure vero ex dictis liquet. Quomodocunque id fuerit, opium hora una ante accessum dabat, et eo plerumque hanc praeveniebat. Si sub ipsa accessione dedisset, periculum sequebatur; si longius ante morbi incursum, nulli effectus ejus usum excipiebant.*

III. GREGORIUS pater opio in Nosocomio Edinensi, non sine magna admiratione, saepe usus est. Atque CULLENUS dixit, nos effectus egregios opii solum non videre, quia adeo diligenter et attente in corticis usum incubuimus. Non tamen est tanta fiducia virium mihi, ut inter viros tam celebres, decernerem; sed litem componat quisquis, qui, se ingenio, doctrina, et experientia supradictis praestare, putaverit:— Quando haec rara avis est——

94. Inter remedia, quae incitando in frequentiam cordis et vasorum motum officio suo funguntur, stimulantia externa, et INTERNA, sudatoria, EMETICA, cathartica, et animi pathemata, versantur.

95. Fuit mos inter medicos applicationes stimulantibus ad carpos, vel tempora, vel maleola,
vel

* Mem: de Math: et Phys: presentés à l'Acad: de Sc: à Paris
t. 2, p. 254.

* Platerus Praxis: med: p: 151, § 29. Riverius Praxis: med: p: 340
Morton Opera t: 2, ex: 1, c: 6, p: 61. Hoffmannus Op: t: 2,
p: 26, § 4. Haen. Nat: med: t: 3, p: 328. Lind hot climates p:
299, 301, § 320. Rosenstein Diseases of children: p: 218.

Hoffmannus loco citato

Lind l: c:

3 Morton l: c:

5 Platerus l: c:

4 Lind l: c:

5 Morton l: c:

Platerus l: c: Haen Nat: med: t: 3, p: 325

1 Ibid: p: 326.

2 Platerus, l: c: —

3 Riverius Praxis: med: p: 340.

= Platerus l: c: Lind l: c: p: 299.

1 Ibid.

2 Plater: l: c:

3 Ibid: p: 152. Hoffmannus l: c: Riverius l: c:

* Hoffmannus l: c: p: 28, § 9. Morton l: c: —

+ Hoffmannus l: c: p: 26, § 4.

x Lind l: c:

o. Ibid: p: 301.

2 Boyle Util: Philosoph: Exerc: exerc: 5: cap: 7. Lind l: c: p:

299 & 301.

§ Hoffmannus l: c: p: 28, § 9.

2x Lind: l: c:

vel dorsi spinam, vel demum ad ventriculi regionem febricitantium, praesertim quartanariorum, mox ante paroxysmos apponere. Hoc quidem ob maximam auctoritatem, quin aliquando successerit, non negari potest.* Fiuntque hujusmodi applicationes ex pipere,[†] rore solis,[×] cepa,²⁴ allium,⁵ chelidonio majore,^o ruta, RANUNCULO,³ helleboro,^{||} salvia,[†] SINAPI,[×] bursa pastoris, millefolio,^P urticis, oleis essentialibus,^o TEREBINTHINIS,^{**} balsamo Peruviano,^{††} petroleo,^{xx} succino,^{oo} muria,⁴⁷ sale ammoniaco,^{ss} et ovis calidis.^{xx} Quamvis viri ita illustres stimulantia externa saepe profuisse testantur, et quamquam eruditus Haenus jam per triginta annos, summo fructu, in quartana rebeli has applicationes instituit; nihilominus raro quidem utenda arbitramur. In febris enim recentibus metuenda, in periculosis infida, et in longis remediis efficacioribus postponenda, sunt. Si autem infans diu febre laboravit, et corticem, medicamentave alia deglutire recusavit, danda opera est, ut sub accessionis expectationem aliquid hujusmodi applicetur. Imo etiam, si in adulto febris inveteravit, et frigore valde molesto comitatur, insuperque cunctanter remediis cedit, adhibendae sunt frictiones calidae et stimulantes dorsi ad spinam; quibus ut plurimum

plurimum mitescit frigoris vis, ut mihi aliquando vidisse contigit.

96. Inter stimulantia externa electricitas enumeratur; qua Lindhoults, in Actis Holmiensibus, se febrem semel sanasse testatur. Actio autem ejus cito transit; nihil igitur fere ex ejus usu sperandum est.

97. Mos apud antiquos fuit, quo medicus febricitantem ubi acceperat, in balneum ducebat, et per tempus paroxyfmi in folio tenebat. Eoque modo febrem discussam saepe videbat CELSUS.* Nec aliud remediorum externorum aptius esse balneo opinor.

98. Ad cohibendos paroxyfmos, ante accessiones stimulantia plura ore adhibentur, quibus rebus, si fas sit mihi judicare, commode febres debellantur, ut jam dicendum est. Licet tamen a populo permulta fuerint administrata, nihilominus ad usum cautiores pauca tantum laudant. Observationes igitur generales in ple-risque recensendis satisficient; quare secundum ordines illa commemorabo.

99. Plantae nonnullae, quas botanici verticillatorum classe comprehendunt, usurpatae fuerunt; scil. mentha[†], chamaedrys, et marubium.^x Hujusmodi autem plantae effectus caducos, ne-
que

x De re med: l. 3, c. 12.

T. Line hot climates. p: 297.

Calore de febril: l. 3, c. 10.

x Ibid:

- * Hoffmannus Op. t. 2, p. 35, § 2.
- + Sauvages Nos. Meth. t. 1, p. 347. -
- ~ Lind hot climates p. 297.
- § Murray App. simpl. t. 1, p. 52.
- || Ligon Eph. Nat. Lut. Dec: 3, 27 & 8. Obs: 74, p. 118 seq.
- o Lind l.c: p. 299.
- 6 ibid. p. 150
- 4 ibid p. 299.
- 3 Hoffmannus l.c:
- ♀ ibid:
- x Lind: Platerus prax: med: p. 149.
- = Hoffmannus l.c: -
- * Platerus l.c: p. 147. -

que motu accelerato cordem attingentes edunt. Merito igitur veluti remedia futilia rejiciuntur.

100. De umbellatis medentes pimpinellam,^{*} et pastinacam[†] adhibuerunt; quae verticillatis praedixi vitia, umbellatis sunt.

101. Tanquam effectus filiquosis stimulantibus evidentiores sint ac praedictis, nihilominus ita fugaces sunt, ut nihil ex iis sperare, aut expectare oporteat. Vulgus tamen sinapi^x et raphano saepe utitur.

102. Plantae coniferae certe magis et apertius in systemate vasculoso actionem incitant. Hujus ordinis terebinthus,^x arbor vitae[§], et cypressi nuclea^{//}, magnis laudibus efferuntur.

103. Nec sunt aliae plantae apud populum usu frequentiores, quam aromata, et eorum affines; scilicet piper,[©] CINAMOMUS,[§] nux moschata,² costus,[§] zedoaria,⁹ zinziber,^x et canella alba. Etiam si ad paroxysmos cohibendos magis opportuna, et magis ex usu remedia esse opinor; nihilo secius aromata in ventriculi partem advocare, nonnunquam et licet et oportet. Nauseam enim saepe tonica gignunt, cujus severitatem aromatibus facile curans mitigat.

104. Aliquando factum est, ut si largius ante paroxysmos comessent, illi impedirentur.[†] Quod nequaquam

nequaquam mirandum est; quippe quod post prandium cordis motus semper acceleratur. Cavendum tamen ne, illud tempus versus, quo infurgunt paroxysmi, absumptorum onere laboret ventriculus; tunc enim pluribus corporis functionibus turbatis vel laesis, non potest sperari debita ingestorum assimilatio.

105. Nec solum vegetabilibus quam numerosis satisfacti, ut nihil relinquerent intentatum, etiam in mineralibus, inesse aliquid ferbi idoneum, medici arbitrantur. Nam calcem vivam, bituminosa, et mercurium adhibuerunt, et laudibus summis extulerunt.

106. ALKOHOL, et ejusmodi liquores, remedia omnia stimulantia, propter vim salutarem et egregiam quam praestant, quanto fieri potest, exsuperant. De usu eorum igitur valde considerandum est, ne quid temere faceremus, ne quid necessarium timeamus.

107. Quidam ex antiquis medicis Cleophantes, in hoc genere morborum, ante accessionem vinum dabat; et deinde consuetudo increbuit. Quamvis enim Asclepiades pleraque Cleophantis praecepta secutus, hoc praeterivit, quia anceps esse duxit; nihilominus, uti CICERO de officio medicorum per id tempus florentium monuit,
qui

- * Senac de febril: Senac: de febr: l. 3: c. 4.
- † Tiptot avis au peuple c. 18, § 259. Heister compend: Med: pract: c. 2, § 17, p. 22.
- x Senac l. c. c. 35.
- § Heppmannus Op: t. 1, p. 450, § 394. Schulze de Mercurio in febr: quart: apud Halleri disp: Med: pract: t. 5, p. 11.
- || Celsus de re med: l. 3, c. 14.
- = Platerus Praxis: Med: p. 132. Sydenham Epist: respons: ad Op: p. 306. Clegghorn Minorca p. ²¹²~~211~~. Werlhof Obs: de febr: p. 173. Lind on hot climates p. 309.

De officio 1,24.

qui in gravioribus morbis periculosas curationes et ancipites adhibere cogebantur; ita subvenire feбри graviori, vino quantumlibet ancipiti sapientis est, eoque magis si plus adipiscare, vino adhibito, boni, quam neglecto, mali. In febribus enim regionum calidiorum remittentibus, ubi pulsus ferme delitescit, cum vix circuit sanguis, cum spiritus vix trahi videtur, cum aeger debilitate confectus jacet supinus, cum febris vix a typho gravissimo distinguitur, quid ex usu vini metuendum? Quid non sperandum est?

108. Inventi autem multi sunt medici, qui non modo in ejusmodi febribus, sed etiam in illis diuturnis quartanis et tertianis, quae incolas Europae magis borealis vexant, vinum adhiberi arbitrati essent. Eo enim dolendum est, devenire medicorum labores, ut pertinacem illarum febrium indolem, et corticis impotentiam, saepe experiantur. Laudatores igitur corticis etiam strenuissimi, una cum illa vinum adhibere, frequenter coacti sunt. Neque sane, quantum intelligo, ulla mala ex usu vini sunt secutura, nisi diathesis phlogistica adfit. Testimonio igitur WERLHOFFII et LINDII inductus, corticem vino adjunctam, remediorum omnium ad paroxysmos

roxyfmos arcendos effe praefantiffimam, opinor.

109. A vini et liquorum vinoforum ufu, quem populus ad febres avertendas accommodavit, fufpiciones medicorum oriuntur. Indocti enim et rudes homines contra febres fpiritu vini, etiam aqua parum temperato, fed imo ad ftimulantia adjuncto, connituntur; quo certe paroxyfmi faepius fugantur; fed morbi plerumque pejores fequuntur, nifi forte febris inveteravit, vel aegri vires plurimum debellavit. Eft enim vinum unum quoddam de fummis et validiffimis remediis, quod quo major eft vis, hoc eft magis cautione jungendum, fummaque prudentia; quarum virtutum expertibus, fi vinum exhibendi veniam tradiderimus, non eos quidem medicos effecerimus, fed furentibus arma dederimus.

110. Vina tamen Gallica et omnia tenuiora nocent ventriculi et reliquarum partium corporis viribus (89.); fic a potu validiori et tutiori fegreganda funt. Et revera, fi effectus folum ftimulantes, quos praefat vini fpiritus, fpectaremus, eum aqua temperatum longe ante liquores alios in febribus pofuerimus. Sed neque aliquid inaffueti ventriculo, quam hujusmodi

modi potus ingratus est; unde nauseam saepe et ventriculi imbecillitatem excitat. Quamobrem huic VINUM MERACIUS, Hispanicum, v. g. Lusitanicum, Hungaricum, vel Africanum, praepono. Quod, si opus fuerit, medenti aqua temporare licet.

111. Ut paucis verbis omnia de vino comprehendam; non ei solo sapientis est inniti; neque, diathesi phlogistica haud vetante, unquam praetermittere.

112. Nec abfuerunt medici, qui stimulantia per anum infundebant *. Nisi autem ventriculus per os assumi vetaret, gerendus minime est huic mos.

113. Quanto rem ipsam putaverim, quando sudatoria ad classem, qua cordis et vasorum motus fit frequentior, relegavi, non faciam ut decernerem. Multa enim eorum sunt, quae, corpori sano adhibita, frequentia cordis motum nequaquam augent. Semper tamen ante accessionem adhibita, sanguinis circuitum per vasa extrema impediri prohibent: Et multa apud ea plane stimulant, quare in hac classe melius collocanda iudicavi.

H

114. A

* Hoffmannus, Op. t. 2. p. 26. § 4.

114. A tempore HIPPOCRATIS usque in usu fuerunt sudatoria externaque internaque ; et antequam cortex inventus fuerat, medici sudatoriiis praecipue febres arcebant. Merito igitur attentionem sibi vindicant. Inter sudatoria externa, calor, FRIGUS, et exercitatio enumerantur.

115. Unumquodque caloris genus, ad sudorem movendum, in febribus usurpatum est ; sed omnium fons et balneum optime conveniunt. Multum tamen infirmant (123.).

116. Nihil dubitandum est, quin nonnunquam FRIGUS, quocunque modo id fuerit, non solum cordis vires auget, sed etiam motum accelerat, et exinde sudorem promovet. Quocirca remedium ad paroxysmos arcendos aptum et idoneum videtur. Et jactant quidem nonnulli, se frequenter sudores, ope potus[†] vel BALNEI FRIGIDI[†], hora ante morbi incursum summo cum fructu movisse. De hac re tamen satis experientiae adhuc deest ; quare non plus impertiam temporis huic cogitationi.

117. Frictio^o, gestatio^o, equitatio^o, et deambulatio^o, si ita instituantur, ut corpus ante paroxysmi invasionem incalescat et sudet, operaque data ut in ipsam exercitationem tempus febris incurrat, paroxysmos nonnunquam sistunt.

Quam.

* Trallienus l: 12, c: 6.

† Morgan Mechanical fracture of Physic p: 179

⊙ felsus de re med: l: 3, c: 12, Platerus Prac: Med: p: 138 & 150.

⊗ felsus l: c:

4 Platerus: l: c:

5 Hoffmannus Op: t: 2, p: 26, § 6. -

Nucorius Prax: med. p: 335. Senae: de febr: l: 3, c: 11.

Sylvius Prax: med: l: 1, p: 262, § 192. Haldschmidt Prax: med:

Motion: p: 137.

Morton Op: t: 2, Ex: 1, c: 6, p: 62. Swieten comment in Aph: 761.

Senae: l: c:

ibid

Mosinstein on the Diseases of Children p: 27:

Quamvis autem opera exercitationis in febrium diuturnarum intermissionibus magna est, nihilominus statim ante paroxysmos adhibitam, multum recte praeteriverunt; anceps enim est. Nam, si paroxysmus gravior aegrum foris exercitatione utentem exciperet, vitae etiam periculum ille adiverit.

118. Sudatoria interna sunt diluentia, sales, stimulantia, et narcotica.

119. Si ingeratur aqua, natura, ut hydropem secuturum arcere possit, sudorem et urinam movet. Et profecto nullum fere est sudatorium, quod, nisi aqua simul corpus impleatur, efficaciter agat. Neque alii tribuenda est actio plurium decoctuum sudatoriorum, nisi aquae, qua cocti fuerint. Porro aqua nec frequentior, nec vehementiorem cordis motum facit; unde in febribus recentibus tutissima; sed in his, etiam et diuturnis, parum efficax est.

120. A vulgo etiam et medicis multa salina, ad sudorem promovendum, adhibita fuerunt; acidum nempe vitrioli^{*}, et succus limonum, et acetosi; et alkali volatile[†], vegetabileque, ex absinthio vel carduo benedicto paratum[§]; et demum sales neutri, scil. sal Sylvii febrifugus^{||}, SAL AMMONIACUS⁼, et Riverii haustus^o. Remedia salina vi quadam involuta et occulta sudores agunt.

agunt. Certe tamen, cordis motu parum accelerato ortum esse sudorem, constat; secure igitur in febribus in inflammationem vergentibus adhibentur; minus autem apud quartanas diuturnas valent.

121. Quicquid in sanis corporibus cordis motum accelerat, id ipsum sudorem movet. Et hujusmodi multa in febrium curatione usurpata sunt; lignum scilicet ^csantalum, ⁴radices ⁵sassafras, ²serpentariae, ³sarsaparillae, ^{*}chinae, [†]bardanae, [‡]veronicae, [§]dulcamari, et ^{||}alii, ⁼folia ^xmelissae, et ^xsalviae; demumque ^ppiper. Stimulantia autem recte praetermittenda sunt; in febribus enim inflammatoriis intuta, et in gravioribus futilia, sunt. Plura eorum quidem ita aqua fuerant temperata, ut nullos effectus ederent, nisi forte aquae saporem celarent. Sed vinum omnium hanc operam optime praestat, et, durante sudore, aegrorum vires egregie suffulcit; quibus de causis, si unquam stimulantium sudanti opus sit, vinum cuilibet praefendum iudico.

122. Ex sudatoriis primum locum obtinent narcotica, ab antiquis pariter ac recentibus ad hunc usum commendata. Pauca tamen sunt in usu adhibita, hyoscyamus [♀]nempe et chelidonium [#]majus; ita enim ad sudandum increbruit usus opii, ut in omni aevo theriaca apud medicos fuit

o Swieten commentin aph: 761.

§ ibid.

4 Sydenhami Opera p: 578.

5 Riverius praxi med: p: 639.

* ibid

† Senae de feb: l: 3, c: 11.

§ ibid & l: 4, c: 4.

|| ibid.

= Linnaeus Amoen: Acad: t: 1, p: 18.

℥ Swieten l: c:

x Sydenham l: c: p: 93.

℥ Celsus de re Med: l: 3, c: 12.

♀ Platerus praxi: Med: p: 148.

℥ Wagnet Eph: Hist: fut: dec: 2, ann: 9. p: 60. Runnerwolff id
dec: 3, an: 2, p: 120. Lange Med: Bruns: clom: p: 122.

* Platerus Prax: Med: p: 148. Biverius Prax: Med: p: 639.
Sydenham Op: p: 93.

+ Donatus Noxro on Military Hospitals p: 2, p: 122. Hæm. Nat:
med: t: 3, p: 322.

< Sydenham Ep: respons apud Op: p: 298.

fuit sudatorium primum. ^{*} Nec ulla re facilius vel efficacius movetur sudor, quam opio, neque ullo modo cordis motum accelerat; certe enim fanis corporibus adhibitum, pulsum articularum tardat; et si unquam in morbo pulsum accelerat, id morbi naturae tribuendum, non remedii indoli, est. Quas ob causas omnium sudatoriorum internorum tutissimum, et praestantissimum, in qualibet febre, opium arbitramur.

123. His de singulis sudatoriis praemissis, tradenda sunt eorum officia universa. Hanc sudatoriorum rationem profuisse pluribus ultro fatemur; sed saepius aut non successisse, [†] aut nocuisse, ^x scriptorum de re medica plures notaverunt. Ancipita ergo sunt. Et quicquid laudis multi sudatoriis tribuant, exemplisque confirmare satagant, testimonia debilitandi tot tantaeque dederunt, ut dicam; valeant ad paroxysmos cohibendos saepissime sudatoria interna; tamen, quoniam vires convellunt, ex eoque ad recidivam aegros procliviores faciunt, postponenda sunt aliis magis tutis, quorum ad hominum usus tantam ubertatem natura largita est.


124. Emeticorum statim ante accessiones adhibitorum opus, ad motum cordis acceleratum, retuli.

retuli. Licet enim, durante vomitione, arteriae motu tenui, debili, et tremulo, digitum feriant; nihilominus illa peracta, dumque vomitorium in ventriculo nauseam faciens adhuc haeret, sanguis corpus motu, praesertim per vasa extrema, liberiore circumit, pulsusque arteriarum molles fiunt et pleni.[†] Isthac cum ita sint, putant quidam hanc emeticorum dandi rationem, recte omnino introductam, nec de ejus vi ad febris arcendas quidquam dubitandum fuisse*. Atque illud sane verum est, quod virorum tot illustrium experientia dicitur; neque a veritate divelli vituperatoribus unquam potest.

125. Prius de effectibus egregiis quos in febribus praestat vomitio (61. *seq.*), nunc autem de vomitoriis, quatenus cordis motum accelerando agant, dicendum est. Non enim vomendo, sed cordis motum accelerando, vomitoria, statim ante paroxysmos adhibita, illos coercent.

* Hippocrates lib. de affect. pag. apud Foes 520. Celsus de re med. l. 3. c. 9. Plateri prax. p. 128. et 147. Riverius l. c. p. 340. Sylvius de le Boe op. l. 1. p. 252. § 187. Sydenham op. p. 86. Morton op. t. 2. ex. 1. c. 6. p. 62. Morgan mech. practice, p. 179. Stedman medical essays, t. 4. art. 5. Senac de febr. l. 3. c. 10. Lind, Bengal Fever, p. 60. Gianella apud Halleri disp. med. pract. t. 5. p. 91. *seq.*

† Cullen Lectures on the Mat. Med. for Edition 2^d 396.



cent. Nec aliquid ex eorum usu in qualibet febre metuendum est. Neque enim vires convellunt, neque multum intendunt, sed intermissiones plenas potius gignunt. Quae cum ita sint, an febres arcendae vomitoriis, necne? Nequaquam ita eorum efficaciae credam, ut totam rem iis committerem. Auctoritati tamen concedendum est, ut si ad intestina purganda opus sit, id per emetica, statim ante accessionem usurpata, perficiatur; dandaque opera est, ut, sub ipso febris incurfu, nauseam faceret medicamentum; saepe enim febris sic discutitur.

126. Jampridem emetica nonnulla in febribus usurpata recensui (68.), ad quae nunc adjungere liceat sulphur *, aquam marinam †, et vitriolum album ‡. Sed ex omnibus vere maximam famam assequutum est ANTIMONIUM; quod ita efficax multi, magna auctoritate pollentes, invenerunt, ut vim febrifugam specificam illi contulerint. Hanc sane nequeo admirari rationem; sed aliae potius adhibendae sunt, quibus animus accedere potest. Et primo quidem, ex omnibus metallicis, et forte vegetabilibus, emeticum

* Lind, hoc climates, p. 399.

† Celsus, l. 3. c. 9.

‡ Waldschmidt, prax. p. 849.

ticum videtur expeditius ad nauseam faciendam. Certo certius itaque antehabendum est omnibus metallicis. Neque dubitandum est, quin metalla, ventriculum stimulando, vomitionem movent; at mihi scrupuli restant, an ejusmodi sit opus plurium vegetabilium, praesertim ipecacuanhae. Multa enim narcotica, sine dubio, vomitionem movent, v. g. opium et nux vomica; neque tamen languentes excitant, sed movendi capacitatem obtundunt. Et narcoticis prope ipecacuanham accedere, qualitates sensibiles et affinitates botanicae ostendunt. Idem forte fuadent effectus ejus in diarrhoeam.

127. Mos fuit apud medicos, antiquiores praesertim, cathartica statim ante paroxysmum aegris desumenda propinare; cum credebant ea non solum prodesse quatenus evacuant, verum etiam quod totum corpus saepe stimulo movent et turbent; quamobrem cathartica validiora, ex regno vegetabili praecipue desumpta, exhibuerunt, qualia sunt agaricus, Senna, Euphorbium, Euphorbium segetalis L. et jallappa. Chemicis quoque placuit mercurium dulcem et ANTIMONIUM, eadem ratione danda. Diuque inter antimonii praeparata hac sine inclaruit pulvis Cornachini, et nuper PULVIS JACOBI.

Priora

* *Platerus praxi*: med: p: 147. *Platerus Viati*: Med: 4.2, p: 218.

† *Pixerius praxi*: p: 629

x *Commerci. Norimb.*: An. 1739. Rel. 2. 32.

§ *Senae de febt.*: l. 2, c. 18.

|| *Commerci. Norimb.*: l. c.

© *Platerus*: l. c.

4 *Pixerius*: l. c. p: 338. *Halderichonid*: *Praxi*: med: sat p: 217

Lind. hot. climatic: p: 277. *Sauvett*: *Hist. Med.*: *Bienn.*: p: 1.

Priora periculi, usufque ancipitis damnare haud vereor, quoniam medici optimi idem fecerunt. Felix enim ille erit medicus, monente Waldschmidtio, qui aliquot ante paroxysmum horas, catharsin etiam mediocrem, citra turbas vegetabilibus stimulantibus, excitare poterit. Tutior tamen ad alvum solvendam antimonii usus censetur. Illa quidem corpus multum infirmant, ad interiora sanguinem depellunt, et febres antea mites saepe duplicant (22.); hoc autem alvum leniter tantum ducit, sudorem ciet, vasa sanguifera lente stimulat, saepeque febres fugat *. Illa igitur semper fugienda; hoc vero, si aliquid vomere vetaret, summo cum fructu usurpandum arbitror.

128. Magna inest potentia animo, pro diversis impressionibus, proxime et directe motus vitales afficiendi; haud mirum est ergo, si multum in morbos tum inducendos tum sanandos ejus regimen valeat. Ad febrem autem tollendam animi motus validiores postulantur; exempla tamen haud defunt, ubi ex horrore, aversatione, vel metu ante paroxysmum excitatis, febris abi-

I verit.

* Riverius l. c. p. 338. Lind, hot climates p. 277.
Lauter Hist. med. bienn. p. 14.

verit. Februm paroxysmi horrendis aliquando et superstitiosis remediis arcentur; nec ullo modo haec agunt, nisi quatenus animi motus vehementiores excitent. Minime tamen curanti conceditur, fraeno tuto horum actionem regere: Ea enim applicaturus nescit effectus consecuturos, an ullos, an rei aequales, vel etiam an lethales, futuros. Qua de re sapientiores talia remedia ad circumforaneos vanos et mulierculas inanes reliquerunt. Hi quidem hujusmodi remediis saepissime utuntur; aegrum manu mortui e cruce excisa repente tetigerunt; axungia humana febricitantes confricarunt; multis precibus et diris verbis febres incantaverunt; diraque et horrenda defumi exhibuerunt; e cranio humano aquam potare jussi sunt aegri; araneae, bufones, urinaque defumuntur; imo itaque natura eorum indurata est, ut sanguinem de primis virginum catameniis devorandum jussisse, haud inhorruerint*. Haec quidem aliquando successerint haud negari potest; fuit enim inter medicos celeberrimos Robertus Whytt, qui, non sine fructu, aegros in nosocomio Edinenfi febricitantes araneas deglutire suadebat. Quandoquidem vero voluntati medici minime subser-
viunt

* Plin. nat. hist. l. 28, c. 7.

Multaque præterea verborum monstra silebo.

Hæc febrem vario depelli carmine posce

Vana superstitio credit, tremulaque parentes.

Samon. de med. c. 55.

Antea disci omnia que potestatem stimulantibus afficienda
rinnant, ea paroxysmis occurrere posse (95.)

si Arteria humeri dextri et femoris sinistri ita
comprimantur ut sanguis circumire nequeat et
d eo tempore factum sit quo febris ingruenda est
nullus secuturus paroxysmus vel si algerit ager
statim facta compressio calor auctus erit et stadium
validum sequenturum erit. Medical Comment Dec: II
p. 271. George Thellie

viunt hi animi affectus, recte eos prudentes praeteribunt.

129. Animi affectus certe nonnullae cordis motum accelerant, et exinde omnes ad hanc classem relegavi. Aversatio autem, et alia nullam hujusmodi vim possident, et eorum operandi modus multis nebulis obscuratur. Postea docendum est, ut quicquid stimulis afficiendam potestatem minuit, id paroxysmis occurrere possit (95.); et forsitan vi simili agunt aversatio, &c. durante enim affectus alicujus opera, animus haud ita facile impressionibus generis, ab affectu quo occupatur, diversi movetur, et statum animi individue corporis status sequitur. Effectus porro, quos habent adversus morbos spasmodicos, plane a mobilitate pendentes, huic opinioni forte gravitatem conferunt.

130. Deinceps, ut erat propositum, de remediis, quae paroxysmis occurrunt augendo vim contractionis, dicatur; et legentium plerisque haud dubito, quin priora minus praebitura voluptatis sint, festinantibus ad haec nova, quibus quidem nihil est febrium curationi accommodatius. Sunt vel mineralia vel vegetabilia.

131. Et primo de remediis mineralibus, quae sunt vel salina vel metallica. Salina iterum
sunt

sunt vel terrena vel neutra. Inter sales terrenos versantur alumen et Kirgeri febrifugum. =

132. Prius videtur vires plantarum astringentium et amararum omnes tenere; et saepissime ad cohibendos paroxysmos valet. * Gratius tamen et efficacius fit quavis ^oaromatica ^oaddita, et fere semper ita adhibitum est. Pauci tamen inveniuntur, quorum ventriculi remedii huius debitam quantitatem ferunt; quo effectus suos plerumque ostendere nequit. Febrifugum Kirgeri est terra calcaria ad acidum tartari adjuncta, [†] de quo nihil intelligo.

133. Tametsi sales neutri ad sudorem movendum saepe usurpata fuerunt (120.), et quamvis forsitan status similis sudori a salium usu semper incidit, hoc plerumque in animo medici nequaquam habebant. Quibuscunque modis fit, hoc certe constat, huiusmodi salium quantitatem mediocrem, statim post ingestam, caloris sensum per corporis superficiem excitare; quod merito sanguinis circuitui per vasa extrema libero tribuant. Sales igitur, in proclive est judicare, aptos esse ad febres debellandas. Sal febrifugus Sylvii, [§]sal ammoniacus, et sal polychrestus praecipue adhibiti sunt. Et licet curatio februm leniorum salibus perficiatur, tamen mihi quidem

* Hoffmannus op. t. 1, p. 450, § 13. Senae de febr: l. 3, c. 11.
Cullen onat: med: p. 105. Lind on the diseases of hot clim:
=ates p. 304.

+ Werthof Ob: de febr: p. 43.

* Senae de febr: l. 3, c. 11.

§ Muys de sal: Ammon: ad febres usu Tranequera 1716 8^{mo}.
Werthof l. c: p. 44. Stork Ann: med: I p. 52. Sautter
hist: Med Vienn: p. 14.

|| Stork l. c: Collin Ann: Med: III. p. 101.

= Having frequently observed the attack of an intermittent
fever to be prevented on its approach by a draught of wine
of powdered crabapples taken in a state of fermentation I
am apt to think there is much greater febrifuge virtue
in such draughts exhibited when in a fermenting
state than in a state of perfect quiet & saturation
Lind on the health of Seamen p. 204

o Thalen Travels into Canada 4, p. 292.

2 Senac de febr: l. 3, c. 11.

3 Hoffmannus Op: t. 1, p. 450, § 3.

8 Riv. Caremeuses Mat: Med: t. 2, p. 536, nota e.

9 Hippocrates de morbis l. 2, apud Foes. p. 472.

Royet pharmac: t. 1, p. 163. Senac: l. c.

* Northgate Marine Practice t. 2, p. 278. Scopol
fl. Linn: 814.

* Lind on the diseases of hot climates p. 305.

+ Hoffmannus Op: t. 2, p. 26, § 5. Thalen Travels into Canada
t. 1, p. 294.

x Triccius de arist: mīe: venenatum cap: 2. Senac de febr:
l. 3, c. 11. Jacobi. Act: Erford: t. 1, p. 216. Werthof Obs: de
febr: p. 41. Haen Metho Med: t. 3 p. 324. Stortm Ann:
Med: II. p. 56. Fowler. Medical reports of the effects of Arsenic in
the cure of Agues. Lond: 1786. Critical Review t. 62. p. 32.

2. Arsenei usus satis esse tutu^m, licet Stahlis nasipae reprehensum,
non dubitandum (critical review); et efficacem experimenta Floyeri et
aliorum plurimorum plene demonstraverunt. Cumque in expeditionibus
militaribus corticem peruvianum secum adhibere aliquando
inconmodum esset, cum que eundem ob nimium pretium esset
ibus saepe visc prebendum, immo et cum ob morbi pertinacitatem
in usu corticis visc persistendum, tum equidem nullum est reme-
-dium magis approbandum quam Arsenicum, ob parvitatem
commodam, ob pretii vilitatem. At vim ^{contra} morbum contumacem
valentem. Si autem non maturius febrem solverit tutius erit
ab eo abstinere. Neque plus in tempore dandum quam grani
decimam sextam partem. Optime que solitior Aqua Juvra
pluviali; cum saepe vitratu ejus lactantur. Ad dito sale aliquo
alkalino uti nos fuit apud Jacobum Floyerum et alios.

* In febrilibus acutioribus, et obstinatis contra corticem, curationem
vidi peractam esse visu Cupri Ammoniaci, neque nauseam
moventis neque ullum ^{ovl} cum inconmodum.

quidem hercle non est verisimile, in his etiam aequae valere sales ac tonica; et in periculosis plane infidi sunt.

134. Tonica, quae ex metallis sumpserunt medici, sunt cuprum^{*}, ferrum[†], et arsenicum[×]. Primum adeo expedite nauseam facit, ut, nisi quoad expectatur vomitio, minime in febribus conveniat. Secundum non nisi multo post effectus suos edit, quo haud valet, nisi in diuturnis, ubi relaxatio obtinet. [¶] Arsenicum, ob qualitates venenatas, quas habet, intutum judicamus, ab eoque penitus abstinendum strenue hortamur.

135. Ad sex classes ex sapore remedia tonica vegetabilia referuntur, scilicet, astringentia, astringentia aromatica, amara, amara aromatica, amara astringentia, demumque amara astringentia et aromatica.

136. Plantae astringentes, quae praecipue apud medicos usum obtinuerunt, sunt cornus⁶, plantago⁴, bistorta⁵, tormentilla⁸, quinquefolium⁹, et QUERCUS[†]. Est videre apud astringentia, eundem effectum in corpore mortuo, (in his locis saltem ad quos sint applicata), quem in vivum etiam edunt. Qui effectus nihil est, nisi contractio fibrarum perdurata. Et igitur, si vires fibrarum, quae etiam in corpore mortuo haerent,

haerent, attenuarentur, astringentia vasa sanguifera valide contrahi efficient; caeteroquin vero capacitatem vasorum minuendo, sanguinis circuitum impediunt, et etiam febrem aggravant. Unde, in febribus recentibus, ancipita sunt, et praecipue ad diuturnas, in quibus obtinet relaxatio, laudantur.

137. Si ad astringentia vis aromatica adjicitur, ob conatum quem contra contractionem dat, remedia ad accessiones occurrentas accommodatiora adipiscamur. Natura autem hujusmodi concessit pauca tantum, scil. cinamomus, et *GEUM*; nec haec etiam vitiorum sunt expertia; in eodem enim vitiorum genere fere, in quo astringentia offendunt, haec reprehenduntur.

138. Herbae amarae, omnibus saltem consentientibus, vires fibrarum contractioni suppetant, nec tamen constringunt, neque in fanis arteriarum pulsum accelerant; videntur igitur ad accessiones arcendas bene aptata. Hujusmodi sunt urtica^x, gentiana⁶, faba Sancti Ignatii^{||}, *QUASSIA*, lignum collubrinum^o, carduus benedictus⁵, et calcitrapa⁵. Ne autem amara multum per seipsa valerent, statuit natura iis saporem valde ingratum, quo nauseam saepissime faciunt.

* Hoffmannus Op. t. 2, p. 26, 35.

+ Flozet pharmac. t. 1, p. 109. Phalm travels into Canada
t. 1, p. 253. Linnæus Amm. Acad. t. 4, p. 40.

x Lind on hot climates p. 299.

5 Blaterus prax. med. p. 149. Senac de febr. t. 3, c. 8.

Murray app. simpl. t. 2, p. 15.

11 Wedelius Am. Mat. Med. p. 337. Wiichner Pharm.

Prax. p. 61. Jungmans de nuc. vomica Hala 1770, p. 1.

= Linnæus Am. Acad. t. 6, p. 426. Fattley Act. Angl. 75.

o Murray Appat. simpl. t. 1, p. 468.

4 Ibid. p. 37.

5 Tournefort Pl. Paris. t. 1, p. 22. Geoffroy Mat. Med. t.

p. 418. Sequest Pl. Veron. t. 2, p. 154.

Stephmannus op: t. 2, p: 26, 9

3 lib.

5 Commerce Norimb. an: 1735, L. p: 11, § 3. Heister disp de
aurant. Halmstedt 1741.

3 Stephmannus l. c:

♀ Commerce Norimb. an: 1734, p: 225.

* Millet Pract: oppien: p: 288.

+ Platerus prop: Med: p: 149, Senae de febr: l. 9, c. 11. Murray
app: simpl: t. 2, p: 20

3 Lind hot climates p: 293.

11 Durand Hist. de la doc. Pratique de Med: a Paris.

= Helwig disp: de Quingrina Europ: cortice Fraxinea:

6ullen Lectures on the Mat: Med: 5th 1^{re} p: 217. Lind
l. c: p: 298.

6 Feyer's phar mac: t. 1, p: 202.

x Lind hot climates p: 302

11 Senae de febr: l. 9, c. 11.

* Edin^d Med^d Essays. t. 6, p: 417. Cullen l. c:

x Stone Act: Angl: vol: 53, p: 195. Celsus nov: variol: m: 11.

p: 128; Egerius disp: de Salice.

7 Gerhard Mat: Med: § 226.

t Senertus op: t. 2, p: 102. Pitcairn disp: med: p: 156 § 74

Morton op: t. 2, Ex: 1, Chap: 6, p: 64. Heister comp: Med:

Pract: c: 2, § 16. p: 27. Haller H: Salu: n: 101. Murray

app: simpl: t. 1, p: 144.

ciunt. Et porro alvum plerumque solvunt; et de hoc magis debilitant, quam roborant.

139. Nihil sane ventriculo ex amaris nausanti est gratius, quam vi aromatica aliquod praeditum. Tribuit ergo alma natura vegetabilia nonnulla, quae vi simul et amara et aromatica fruuntur, scil. cortices capparum, tamarisci, et aurantiorum, lignum fantalum rubrum, et absynthium, et matricaria. Hujusmodi autem plantae ad alvum solvendam procliviores, quam etiam amara ipsa sunt; quam ob causam sequentibus postponentur.

140. Ut alvum solutam evitare posset, natura ad amara adjecit astringentia, quod videre est in centaurio minore, ruta, in foliis aquifolii, et in corticibus visci, Swietenii, vulgo mahogoni, FRAXINI, pruni sylvestris, hippocastaneae, SALICIS ALBAE, nec non et FRAGILIS. Fertur haec omnia non sine summo fructu adhibita esse; nauseosa tamen sunt.

141. Cavent autem aromata, ne quam nauseam praedicta excitarent. Et vere de his tribus qualitatibus, nempe de aromate astringenti et amaricanti, fiunt remedia adversus febres longe praestantissima, scil. flores CHAMAEMELAE,

ARNICA

ARNICA MONTANA, calamus aromaticus, folia lauri, caskarilla, et CINCHONA.

142. Missis tamen medicorum laudibus, de aliis remediis tonicis, forsitan nimis, CORTICIS efficacia contra intermittentes in primis notanda est. Posteaquam vero TORTUS, MORTONUS, WERLHOFFIUS, alique magni nominis, corticis efficaciam omnibus hucusque cognitis remediis multum superiorem, sed et summam ejus innocentiam, evidenter demonstraverunt; de hoc quod sentiam, quid attinet dicere? Rem porro a fonte referre, ne nimis fero ad extrema veniamus, supervacaneum habeo.

143. Nullum remedium aequè est amarum atque cortex, quod tamen aequè gustui gratum sit, nec quod minus saepe alvum solvat, vel vomitum moveat. Non igitur mirandum est, si alia tonica viribus longe exsuperet. Disquisitio de operandi modo tempus frustra solum contereret; quo tempore enim HOFFMANNUS in medicinae scholis inclaruit, et quo tempore CULLENUS argumentum suscepit, medici plures, et omnes in hoc loco, saltem sapientes, nullatenus corticem esse remedium tonicum, vi istaque operam suam perficere, dubitaverunt.

144. At-

* Schutt de riv: Arn: Mont: Goeting: 1774. 817. 1^{re} ed:
- etrusc: Mat: Med: t. 1, p. 287. D. Monro Military
Hospitals t. 2, p. 212.

† Cullen Lectures on of Mat: Med: 2^d ed. p. 302

x Lind on hot climates p. 298.

§ Hofmannus op: t. 2, p. 17, 513, et p. 35, 52. Werlhof
Obi: de feb: p. 27. Lind l. c.: p. 305.

§ Morton Op: t: 2, Ex: 1, c: 8, p: 102. Tison's avis au peuple
c: 18, § 260. Cullen prælect:

* Morton Op: t: 2, Ex: 1, c: 8, p: 102. Torti Ther: spec: l: 1, c: 7.
Hoffmannus Op: t: 2, c: 14, § 9. Werlhof Obs: de febr:
p: 88. Cullenus First lines ccxv.

† Baglivi's præp: med: l: 1, c: 13 § 9. Hoffmannus Opera
t: 2, p: 17, § 20; p: 28, § 13. Helvetius méthode de guerir
fièvre sans rien prendre par la bouche; Werlhof
Obs: de febr: p: 78.

x Pye London med: Obs: t: 7, p: 255. Rosenstein on the
diseases of children p: 221.

144. Atque in primo loco, et id sedule cavendum est, ne cortex non in debita quantitate ingeratur. Nec minus corticis communis, et secundum morem assuetum adhibitae, satisfacit, quam in quotidiana drach. vi. in tertiana unc. i. et in quartana unc. $i\frac{1}{2}$.^s Et revera, si spes in angusto sunt, cortex eo usque adhibenda, dum a ventriculo recipi poterit.

145. Longe vero efficacior est in substantia, et in pulverem subtilissimam trita, quam in decocto, infuso, extracto, aut essentia; quae raro per se valent, sed ingrata sunt, et prodiga. Oportetque medicum corticem per os adhibere, quod ad exitum fere semper perducere potest. Si nauseam vel vomitum moveret, apponendum est opium, vel aeger superbibat haustum salinum adhuc effervescentem. Si alvum solverit, una adhibenda sunt opium vel astringentia. Si velis corticem infantibus forberi, glycyrrhizae extractum adjiciendo, illis plerumque persuadeas. Si autem non adducantur ut exhauriant, per anum summo cum fructu injiciendum multi arbitrantur.[†] Fertur etiam ex cortice ad cutem applicata febres esse sanatas^x; quatenus hoc februm curationem reponere liceat, nescio;

postponendum tamen, vel per os, vel per rectum, adhibendi modo plerique existimant.

146. Experti novimus medicos clarissimos, etiam corticis laudatores strenuissimos, monuisse, ne in febribus cortex ingeratur, donec morbus jam per aliquod tempus duraverit. Tum equidem, quoad periculum ejus urgeat, ad corticem, veluti ad sacram anchoram, confugiendam, strenue hortantur. Omnes febrium status, qui corticis usui obstant, jam observavi; et his praesto, mala ejus adhibitionem secutura, nullatenus dubito. Sed haec et his similia, utcumque corticis vituperatoribus animadversa, aut existimata erunt, haud in ullo equidem ponam discrimine; illis statibus (24.) enim absentibus, febres ab initio tute et commode cortice curatum iri, una cum illustrissimis medicis, quos enumerasse temporis nimium contereret, prorsus existimo.* Unum solum his adjiciendum est, nempe, quod cortex, ob qualitatem suam astringentem, catameniis instantibus, intuta habetur. Et licet menstrualis fluxus usum corticis, si febris periculum minetur, non prohibeat, sed etiam postulet; attamen, sub regulari fluxu, in febre periculi experte, lubenter manum suspendimus, et pavori sexus, quem adeo formosum esse,

* Sydenham Op: p: 94. Boerhaave Aph: 767. Sweet
comment, in aph: cit. Bringle on the Diseases of the
Army p: 204. Torti Ther: Spec: p: 97.

+ Werlhof Obs: de febr: p: 32 & 97.

x Pleghorn in mild cases after evacuations trusts the
cure to nature Minorea p: 205.

- * Lind on the Bengal Fever: p. 60. Monro on the
diseases of the West Indies § 73. Glavin on the disease
of warm countries p. 145.
† on the climate & diseases of Barbados p. 22.
x Diseases of hot climates p. 312.
§ Diseases of the Army p. 204.
|| Military hospitals, t. 2, p. 88, 89.

esse, vel propitii vel irati dii voluerunt, misericordia aequa concedimus; neque remedia quantumcunque generosa exhibemus, nisi gravis indicatio urgeat.

147. Vix attinet dicere, quod corticem in intermissionibus et remissionibus praecipue dare convenit. Posteriores quod spectat, jam a multis annis, MORTON, TORTI, WERLHOF, et aliis innotuit, quam sit tutum et necessarium, per corticem remittentium plurimum curationem moliri. Et porro compertissimum est, quod, si remissiones vix ullius momenti sint, jam tum corticem postulari; et imo etiam, si febres summa debilitate stipantur, et continuae fiunt, aegros, cortice omissa, in vitae discrimine versari; ex imbecillitate enim summum est periculum. At ne illud quidem, ab Hillary, LIND, PRINGLE, et D. MONRO dictum, ratione omnino caret. Ubi enim cordis actio aucta aegrum, durante paroxysmo, habet, tunc quidem cortex proficere nequit; sed paroxysmum longiorem faciet, et inde brevius a sequente excipiendum.

148. De modo corticem adhibendi, etiam in intermittentibus puris, sub judice lis est. Tutissimum enim a plerisque censetur, finito paroxysmo,

xyfmo, incipere corticis ufum, et partitis vicibus illam fic exhibere, ut debita ejus quantitas affumi poffit, antequam fequens expectetur paroxyfmus. Datur tamen praeflantiae laus methodo, in qua ejus drach. v. feu iv. fimul ingerantur; id enim valet ad fequentem acceffionem inhibendam, quod major quantitas, partitis vicibus data, praeflare nequeat*. Hoc forte fatifaciet controverfiam adhuc fub lite decernere. Dum enim prima in Europam deferretur cortex, dabant fecundum praecepta fchedulae Romanae tantum, quantum opus fuerit, una vice ftatim ante acceffionem; et quidem confuetudo increbuit†. Alii autem plus valere corticem, ftatim poftquam febris difcefferit datam, exiftimant‡. Utramque experientia in partem advocatur.

* Werholf, obf. de febr. p. 172.

† Fraffonius apud Torti, ther. fpec. p. 3. Liffier mantiff. ad exerc. de hydrophob. p. m. 55. feq.; Doloeus encycl. med. p. 185.; Bartholinus, hift. anat. cent. 5. hift. 50.; Schelhammerus de meth. cur. febr. p. 142.; Cullen, firft lines, ccxxxii. 4.; Saunders, red Peruvian bark, p. 57.


‡ Sydenham, epift. refponf. op. p. 302.; Torti ther. fpec. l. 3. c. 3. p. 161.; Hoffmannus, op. t. 2. p. 16. § 1.; Caretheufer, mat. med. t. 2. p. 541.; Cleg-

* Saunders Essay on the Red Pest

+ London Med. Journal 4:3, p. 492

x ibid. p. 314.

& Phil. Trans. t. 67, part 2, p. 504.



vocatur. A neutra parte stamus; sed de tempore in quo cortex ingerenda est, dicam ut sentio. Non sane interest quo tempore, sed quantum temporis, fuerit. Quo enim celerius cortex ingeratur, eo magis effectus validiores erint.

149. Celsus venerabilis quondam dixerat, quod, si febris quievit, diu meminisse ejus diei, convenit; facile enim revertitur, nisi a sano quoque aliquando timetur. Et revera plane videtur, quod huic praecepto experientia tribuat. Et, licet in recidivis praecavendis, primum locum habeant victus vitaeque regimen; nihilominus multum quoque adjuvat cortex rite adhibita. Ratio, quam plurimi sequuntur, est, febre fugata, quotidie drach. iii. vel iv. partitis vicibus convalescenti impertiri; sed non solum ex ratiocinatione, sed ex usu, inanem operam navasse videntur. Nemo enim ignorat, quam saepe recidiva hoc nihil interdicente eveniunt. Et porro, si paroxysmum quodam die expectarem,

Cleghorn, Minorca, p. 188.; Home, clin. exper. p. 1.;
— Saunders, 1 c. p. 58.

En quid agas? duplice in diversum scinderis hamo,
Huncine, an hunc sequeris?—alternus oberres.

rem, anne hujusmodi dosi avertendum credidisse licebit? Nequaquam. Nonne idem expectare sapientis est, si causae, febrem reducendi sufficientes, admotae fuerant? Nonne paroxysmus ita secuturus, corticem aequae ac ullus alius, exegerit? Omnino certe. Medici igitur praestantissimi, hac ^{ratione} ~~actione~~ fusque deque habita, ad certiores et minus prodigas se receperunt.* Inter omnes autem corticem adhibendi ratio Culleni longe effulget. Ille quidem, aegro in integrum restituto, tempus accessionis primum omittit; sed corticis quantitatem, accessioni occurrendi sufficientem, ante accessionis secundae tempus, adhiberi jubet; proximo, accessiones duas praetermittit, at quinta corticem adhibendam monet; porro et iterum, tres accessiones praeterit, at ante octavam corticem iterat, &c.

150. Omnino sapiens et cautus medicus duas adhuc res de corticis usu cernit, quarum una in corticis conditione ponitur; cum persuasum sit, nihil corticem, nisi quam vegetam et sanam, aut optare aut expetere, oportere. At eheu! prae fordida avaritia, quam saepe capsulae medicamentariorum cortice effoeta, insipida, et putida, implentur. Altera res est, ut corticis speciem feligas maxime efficacem. Cl. Arrat primus species

* Sydenham Epist. respons. Op. p: 303. Werthof. Obs. de
febr. p: 173. Fleister compend. Med. p: 29. Rosenstein Di
of children p: 222.

* Phil: Trans: t: XL p: 81.

+ Mem: Acad: Sc: a Paris An: 1738, p 228.

species diversas innotuit. Et quatuor, nempe, rubram, flavescentem, involutam, et albidam, statuit.* Ill. CONDAMINE ejusmodi distinctionem egit.† Ab illis cortex albidus fertur etiam specie botanica a caeteris discrepare, et ex siccatione effoeta futilisque fieri. Aliae autem non specie botanica, sed situ solo et curatione, discrepare, et merito forte, censentur. Cel. Arrat corticem involutam ob futilitatem relegat; et, licet quondam magna laude floreret, nunc tamen male auditur, et si sapore licet judicare, cum optimo jure. Ex Arrat narratione in proclive erit judicare, corticem rubram a flavescente non, nisi modo quo exsiccata fuerat, discrepare. Facturusne autem operae pretium sim, si species diversas omnino stabilierim, varietatesve omnes earumque rationesprehenderim; nec satis scio; nec, si sciam, dicere velim. Utcunque erit, juvabit tamen, inter eas efficacior, pro virili parte, et ipsum consuluisse.

151. Non a ratione videtur abesse opinio, quam nuper protulit Cl. Saunders, nempe quod cortice rubra solummodo usi erant antiquiores. Hincne autem illi concedere licet, corticem istam esse efficacior, quia antiquiores illam, summo cum fructu, parcius exhibebant? Non

deest


deest saltem quod huic opinioni objici possit. Antiquiores enim corticem adhibebant variis modis (107. 108. 148.), quos hodierni rejiciunt; et his forsitan eventus secundi, qui tum secuti fuerunt corticis usum, tribuendi sunt. Saunders attamen sententiae testimonium multi ex medicis Anglicis perhibent, et porro celeberrimi Camper experientia sententiam corroboratam invenimus. Contra autem Arrat et Ill. Hahn corticem rubram saepe adhibitam viderunt, neque effectus ejus praestantiores invenerunt. Testimonium tamen numeri gravitate in parte Saunders praeponderat; igitur adhuc ad illam judicium inclinari oportet; quanquam aliquid rerum novitati concedendum est.


152. CINCHONA CARIBAEA LIN. curate ab inclyto Wright depingitur, magnisque laudibus, ut remedium praestantissimum contra febres Jamaicae remittentes, effertur. Imo etiam haec magis est ^{sapori grata} ~~dulcis~~ quam Cinchona officinalis, et tamen aequae amara et astringens; nec de testimonio tanti viri quodammodo dubito, quin in hac arbore inveniri possit febrifugum efficax et abundans.

Jam satis est; ne me Crispini scrinia lippi

Compilasse putes, verbum non amplius addam.

F I N I S.






~~235~~

9

235.



Osler
Room

E239

1783

B9183

#82623474

706

AE

